

fuesen, hechos que se encuentran en contradicción con la propia ortodoxia taxonómica de dichos autores.

Un análisis cuidadoso de estos problemas, aplicado al género *Goniomma*, haciendo uso de las mencionadas teorías taxonómicas, conduce a negar la utilidad —dentro de sus supuestos— de la mayoría de los caracteres empleados en la clasificación del género, como se puede deducir del apartado anterior.

De admitir las premisas precedentes, las especies válidas de *Goniomma* se reducirían a: *G. blanci* (ANDRÉ) y *G. hispanicum* (ANDRÉ), aunque quiero hacer notar una vez más que los taxones *G. punicum* y *G. burri* no han podido ser estudiados.

A la vista de las conclusiones antes expuestas, creemos imprescindible hacer una nueva descripción de las especies estudiadas.

#### REDESCRIPCIÓN DE LA OBRERA DE *Goniomma blanci* (ANDRÉ), 1881.

Perfil del clipeo, en vista dorsal, cóncavo-recto; ojos alcanzando el margen cefálico anterior.

Ambos caracteres son los únicos diferenciadores, pero, a fin de ampliar su contexto, añado otros y contemplo su amplitud: rugosidad de cabeza y tórax, variable, desde completamente rugosas ambas porciones a casi totalmente lisas; color uniforme, variando su tonalidad de negra a negra-parduzca; forma de las espinas y ángulo espino-epinotal, variables; base peciolar, más o menos uniforme, sin presentar en ningún caso un diente claramente distinto.

#### REDESCRIPCIÓN DE LA OBRERA DE *Goniomma hispanicum* (ANDRÉ), 1882.

Clipeo convexo y ojos alejados del margen cefálico anterior, como definatorios.

Sus rugosidades cefálica y torácica son variables, desde completamente rugosas a cabeza y tórax prácticamente lisos (salvo algunas arrugas en el pronoto). Color muy variable, uniformemente coloreadas —negras o pardas— y policoloreadas, con tórax rojo más o menos vivo y el resto negro o parduzco. Base peciolar muy variable, de plana a dentada. Forma de las espinas y ángulo espino-epinotal, muy variables.

Propongo para esta especie las siguientes sinonimias:

*G. hispanicum* ANDRÉ, 1882.

*G. hispanicum* st. *tuneticum* SANTSCHI.

*G. hispanicum* st. *tuneticum* var. *nitidifrons* SANTSCHI.

*G. hispanicum* st. *tuneticum* var. *barbaricum* SANTSCHI.

*G. hispanicum* st. *gallicum* EMERY.

*G. maurum* SANTSCHI.

*G. otini* SANTSCHI.

#### Resumen.

Reviso en este trabajo los caracteres que se utilizan en la taxonomía de *Goniomma*; perfil clipeal, distancia desde los ojos al margen anterior de la cabeza, rugosidad cefálica, rugosidad torácica, longitud de la pilosidad cefálica transversal, color del cuerpo, perfil del borde peciolar, forma de la espina epinotal y ángulo espino-epinotal. Llevo a cabo una división de