

triadas. Tórax brilhante com escultura reticulado-rugosa; no protórax a face anterior com fortes rugas transversais; no mesonoto fortes rugas semicirculares; coxas anteriores com estriação muito forte, fêmures brilhantes e lisos. Asas hialinas um pouco amareladas, as nervuras e estigma castanhos escuros; hamulos das asas posteriores variam entre dez e onze.

Pilosidade: ereta e esparsa na cabeça, tórax, pecílio e gáster, neste também apressa. Pubescência simples nos seis últimos artículos do funículo.

DISCUSSÃO TAXONÔMICA

Esta espécie é muito semelhante à *E. suzanae* e pode ser facilmente confundida com esta, mas distingue-se principalmente pelo espinho epinotal pontiagudo e pelas estrias semicirculares no mesonoto.

Ectatomma muticum Mayr, 1870

Ectatomma muticum Mayr, 1870, Verh. Zool. Bot. Ges., 20: 939-996.

Ectatomma muticum Var. *lobuliferum* Forel, 1909, Dtsch. Entomol. Z., 254: 239-269.

Fêmea - Comprimento total 11.72mm; da asa anterior (Fig. 5) 8.44mm; da posterior (Fig. 6) 6.25mm; do tórax 4.69 mm; da cápsula cefálica 2.75mm; do olho composto 0.63mm; largura da cápsula cefálica 2.46mm; do pronoto 2.74mm.

Cor: (predominantemente) ferruginea; mandíbulas (exceto os dentes pretos), escapo e patas marrom-amareladas; artículos apicais das antenas marrom-amarelados.

Tegumento: cabeça subopaca com escultura reticulado-rugosa; fronte, clipeo, área malar e genas com fortes rugas longitudinais; fossa antennal e escapo com finas estrias longitudinais; mandíbulas brilhantes e fortemente estriadas. No protórax, a face dorsal com fortes rugas concéntricas, no mesonoto finas rugas semicirculares; coxas anteriores com estriação muito forte,