

Pilosidade: ereta e esparsa no vértice, escapo, torax e gáster, neste e nas mandíbulas também apressa. Pubescência simples no funículo e fossa antenal.

## DISCUSSÃO TAXONÔMICA

Esta espécie faz parte do grupo onde estão incluídas as espécies *E. vizottoi* e *E. permagnum*, e evidenciou mais afinidade com a primeira, ditingindo-se desta pela disposição das rugas no mesonoto, que são semicirculares, e de forma ovalada em *E. vizottoi*. Difere da segunda principalmente pela escultura do tegumento, muito mais delicada nesta que em *E. lugens*, deferindo ainda na forma da escultura do pronoto com um tubérculo mediano de forma aplanado, que é mais acentuado em *E. permagnum*.

*Ectatomma permagnum* Forel, 1908  
*Ectatomma opaciventre* Var. *strigosum* Emery, 1894, *Boll. Soc. Entomol. Ital.*, 26: 137-242.  
*Ectatomma opaciventre* Var. *permagnum* Forel, 1908, *Verh. Zool. Bot Ges.*, 56: 340-418.  
*Ectatomma opacum* Var. *confusa* Forel, 1909, *Ostch. Entomol. Z.*, 254: 236-269.  
*Ectatomma strigosum* Var. *aereum* Forel, 1912, *Ann. Soc. Entomol. Belg.*, 56: 28-49  
*Ectatomma regis* Kusnezov, 1957, *Rev. Soc. Uruguaya Entomol.*, 2 (1): 341-380.

Fêmea - Comprimento total 12.50mm; da asa anterior (Fig. 7) 10.63mm; da posterior (Fig. 8) 7.50mm; do tórax 4.69mm; da cápsulacefálica 2.97mm; do olho composto 0.78mm; largura da cápsulacefálica 2.40mm; do pronoto 2.00mm.

Cor: (predominantemente) marrom-escura a preta; mandíbulas (exceto os dentes pretos), patas e gáster ferrugíneos; artículos apicais das antenas e palpos marrom-amarelados.

Tegumento: cabeça, tórax e gáster com escultura reticulado pontilhado; vértice com seis fortes rugas longitudinais, fronte com carena sagital forte; área paraocular com fortes rugas longitudinais; escapo, patas e pecíolo com pontuações finas e densas; mandíbulas brilhantes e fortemente estriadas. No prototorax e face dorsal com três dentes, dois posteriores laterais e obtusos, um mediano anterior com finas estrias longitudinais; mesonoto com finas estrias semicirculares; coxas anteriores com estriação forte. Asas um pouco enegrecidas com nervuras e estigmas escuros; hâmulos das asas posteriores variam entre nove e dez.