

No epinoto, a face basal com fortes rugas transversais; segundo tergo do gáster subopaco com finas estrias longitudinais.

Pilosidade: ereta e esparsa na cabeça, tórax, pecíolo e gáster, neste também apressa. Pubescência simples no funículo, coxas médias e posteriores.

DISCUSSÃO TAXONÔMICA

Esta espécie faz parte do grupo onde estão incluídas *E. lugens* e *E. vizottoi* sp. n., e evidencia-se uma maior afinidade com a primeira, distinguindo-se desta na coloração que varia de enegrecida a preta, e com fortes rugas longitudinais no fronto. Difere da segunda na escultura do pronoto, em que as duas espécies assemelham-se no dente mediano pronotal, sendo este mais acentuado em *E. pernigrum* que em *E. vizottoi* sp. n.. Outra característica que as diferenciam é o mesonoto com fortes rugas de forma ovaladas em *E. vizottoi* semicirculares em *E. pernigrum*.

Ectatomma suzanae Almeida, 1983

Ectatomma suzanae Almeida, 1983, Tese mestrado (não publicada).

Fêmea - Comprimento total 10.00mm; da asa anterior (Fig. 1) 7.50mm; da posterior (Fig. 2) 5.30mm; do tórax 4.06mm; da cápsula cefálica 2.48mm; do olho composto 0.56mm; largura da cápsula cefálica 2.19mm; do pronoto 2.20mm.

Cor: (predominantemente) marrom-escura; mandíbulas (exceção os dentes pretos), tórax e patas marrom-amarelados; gáster ferrugíneo.

Tégumento: cabeça brilhante com escultura reticulado-rugosa; fronte, áreas malar e gena com finas rugas longitudinais; na fossa antenal e escapo, a estriação muito fina, predominando as longitudinais; no clipeo fortes rugas longitudinais; mandíbulas brilhantes fortemente estriadas. Tórax brilhante com escultura reticulado-rugosa; no protórax enrugamento forte concêntrico; no mesonoto finas rugas longitudinais, nas coxas anteriores estriação muito forte; fêmures brilhantes e lisos. As asas hialinas, levemente ferrugíneas com nervuras e estigma enegrecidos; hamulos das asas posteriores variam entre dez e onze. Epinoto com dois tuberculos obtusos e fortes rugas transversais; no pecíolo, a face dorsal com fortes rugas transversais na metade anterior, na posterior semicirculares; no segundo tergo do gáster, metade da face anterior com fortes rugas longitudinais, na posterior e laterais-transversais.