

Pilosidade: ereta, curta e esparsa na cabeça, tórax e gas
ter, neste também apressa. Pubescência simples nas antenas, co
xas médias e posteriores; nas mandíbulas e gena pêlos decumbe
tes.

DISCUSSÃO TAXONÔMICA

Esta espécie é muito semelhante à *E. edentetum* e pode ser facilmente confundida com esta, mas distingue-se principalmente na coloração da cabeça e tórax de cor mais clara; nos espinhos epinotais vertiginais ou ausentes; no mesonoto com rugas finas longitudinais.

Ectatomma vizottoi Almeida, 1983

Ectatomma vizottoi Almeida, 1983, Tese de mestrado (não publicada).

Fêmea (sem asas) - Comprimento total 15.60mm; do tórax 5.90mm; da cápsula cefálica 3.50mm; do olho composto 0,80mm; largura da cápsula cafálica 3.00mm; do pronoto 2.60mm.

Cor: (predominantemente) marrom-amarelado; mandíbulas (ex-ceto os dentes pretos), escapos, patas e lados do tórax marrom-amarelados; gáster ferrugíneo.

Tegumento: cabeça subopaca com escultura reticulado-rugosa; vértice, gena e área malar com fortes rugas longitudinais; fossa antenal e escapo com estriação fina predominando as rugas longitudinais; fronte com uma carena sagital fortemente arqueada; mandíbulas subopadas e fortemente estriadas. Tórax subopaco com escultura reticulado-rugosa; pronoto com três dentes, dois posteriores laterais e obtusos, um mediano anterior, neste fortes rugas longitudinais; no mesonoto a face dorsal com fortes rugas circulares, estas no centro do disco de forma ovaladas, fêmures e face anterior do pecíolo brilhante e lisos. No pecíolo, a face posterior com fortes rugas transversais; pospecíolo subopaco com escultura reticulado-rugosa; na metade anterior da face dorsal as rugas são dispostas transversais, na posterior semicirculares (os semicírculos abertos em direção ao segundo tergo do gáster); no segundo tergo estriação muito fina.