

лярно к длинной оси торакса. Обращаю внимание, что индекс длины скапуса на длину головы приводится мной часто параллельно с другим признаком, а именно — величиной, на которую скапус выдается за затылочный край головы; это — обычный признак определительных таблиц.

В нижеследующей таблице сведены вычисленные индексы.

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ

Aphaenogaster januschevi K. Arnoldi, sp. n.

♀. По удлинённой форме тела, его пропорциям и длинным конечностям напоминает *rothneyi* (см. таблицу).

Голова овальная (см. рисунок, 1)¹, в затылочной части вытянутая, боковой край от глаз до шейного воротничка закруглен очень слабой дугой; наличник не трапециевидный, широко закругленный, без лопасти впереди; передний край в середине приплюснут и явственно выемчатый.

Виды. ♀	Индексы					
	дл.: шир. головы	дл. скапуса: дл. головы	дл.: шир. 3-го членика жгутика	дл.: высота торакса	дл.: шир. задн. голени в середине	средн. длина муровья, мм
<i>pallida</i>	1,05—1,10	0,88—0,93	1,19—1,28	2,40—2,52	509—5,3	4,3
<i>subterraneoides</i>	1,07—1,12	0,88—0,94	1,25—1,30	2,50—2,59	5,1—5,4	4,1
<i>ssp. armeniaca</i>	1,07—1,14	0,83—0,93	1,11—1,25	2,36—2,51	5,5—6,2	3,9
<i>obsidiana</i>	1,12—1,21	0,80—0,90	1,20—1,32	1,20—2,33	6,4—6,9	6,2
<i>subterranea</i>	1,12—1,20	0,88—0,96	1,06—1,22	2,3—2,9	5,0—6,0	5,2
<i>sinensis</i> (При- морье)	1,18—1,27	0,97—1,10	1,60—1,72	2,52—2,70	5,7—6,7	5,6
<i>sinensis</i> (Курн- лы)	1,28—1,30	1,04—1,05	1,44—1,46	3,0	6,0—6,3	5,1
<i>sinensis</i> (КНР)	1,30	0,95	1,43	2,5	6,3	4,3
<i>smythiesi</i>	1,04—1,06	1,15—1,22	1,30—1,35	2,60—2,77	6,56—6,67	4,9
<i>ssp. kurdica</i>	1,17—1,21	1,02—1,08	1,50—1,58	2,2—2,8	6,0—6,6	5,6
<i>gibbosa</i>	1,28	1,10	1,75—1,90	2,63	7,5	4,8
<i>ssp. muschaldica</i>	1,20—1,30	1,10—1,17	1,60—1,78	2,7—3,2	6,25—6,40	6,0
<i>ssp. chorassanica</i>	1,25—1,32	1,02—1,08	1,67—1,89	2,85—2,94	7,02—7,37	5,3
<i>festai</i>	1,35	1,18	1,80	2,6	8,0	4,6
<i>georgica</i>	1,28—1,38	1,08—1,19	1,57—1,65	2,95—3,18	6,8—7,4	4,7
<i>splendida</i>	1,33—1,49	1,23—1,27	1,80—2,02	2,90—3,02	8,6—9,8	5,5
<i>ssp. transcauca- sica</i>	1,28—1,32	1,13—1,16	1,68—1,70	3,0—3,1	6,40—6,65	4,8
<i>fabulosa</i>	1,42—1,52	1,22—1,27	2,40—2,52	3,30—3,35	11,0—11,8	6,2
<i>januschevi</i>	1,31—1,40	1,18—1,31	2,30—2,57	3,03—3,30	11,7—12,6	7,0
<i>rothneyi</i>	1,47	1,29	2,35	3,45	13,0	6,2

Торакс длинный, пронотум сверху почти квадратный, с намеченными в виде тупых уголков плечами, впереди довольно широко округлен, мезонотум в профиль не выдается над пронотумом. Основная поверхность эпिनотума очень слабо выпуклая, шипы острые, тонкие, приподняты под углом 45—50°. Стебелек петиоля тоньше, чем у *rothneyi*, узелок небольшой, в профиль (26) передняя поверхность почти отвесная, задняя пологая выпуклая, отчего узелок кажется направленным немного вперед; постпетиоль очень широко закруглен.

Передняя часть головы с нежными неправильными продольными морщинками, лучше развитыми на щеках, промежутки более или менее блестящие; сзади уровня глаз развита тонкая шагреня, затылок гладкий, блестящий. Волоски небольшие, их длина на скапусе меньше его поперечника в середине. Цвет коричневато-желтый.

¹ Ниже ссылки на рисунок даны цифрами курсивом в скобках.