

дельных территорий, тех, с которыми могут быть смешаны при определении наши виды.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ *ARHAEENOGASTER*

- 1(28) Брюшко гладкое, блестящее
- 2(27) Задние углы головы намечены и более или менее круто закруглены или голова сзади широко округлена, совсем без задних углов. Передние крылья с двумя кубитальными ячейками подрод *Attomyrta* Em.
- 3(18) Голова более или менее прямоугольная (5) с намеченными, хотя и закругленными задними углами. 2—6-й чл. жгутика усика короткие или длинные, но их длина всегда меньше, чем вдвое, превосходит ширину.
- 4(15) 2—6-й чл. жгутика усика короткие, в длину не более чем в 1,4 раза превосходят ширину; длина скапуса у крупных и средних рабочих обычно меньше или редко не больше длины головы (кроме *smythiesi*); отношение длины головы к ширине обычно менее 1,2 (кроме *sinensis*).
- 5(10) Мезонотум совсем не приподнят над пронотумом (6, 7), а если немного и приподнят, то в профиль образует слабую закругленную выпуклость. Отношение длины головы к ширине не более 1,13; длина скапуса хотя бы немного меньше длины головы; отношение длины и ширины задней голени в середине 5,0—6,0.
- 6(9) Эпинотум с тонкими шипами. Тело удлиненное, мезонотум и эпинотум уплощены, покатая поверхность последнего не крутая.
- 7(8) Голова покрыта продольными морщинами, лишь в задней трети почти гладкая; блестящий, светло-коричневый, голова и брюшко темнее (6). 3,5—4,7 (♀, ♀, ♂). Лесной мезофил, у нас: Прикарпатье, Молдавия, Крым, Кавказ *A. subterranea* Latr.
- 8(7) Голова, как и все тело, блестящая, гладкая, только на лбу и щеках бывают легкие морщинки; окраска изменчива: от серно-желтой до темно-коричневой, конечности светлые. 3,7—4,2. Восточное Средиземноморье, Крым, северо-западный Кавказ, гемиксерофил (рис. Арнольди, 1968а: 1807) *A. subterraneoides* Em.
- ssp. *armeniaca* K. Agp. отличается хорошо развитой выемкой на наличнике, отстоящими под 45° волосками в дистальной части скапуса; одноцветно светло-коричневый, очень блестящий. 3,2—3,5. Армения.
- 9(6) Эпинотум, лишь с тупыми углами без зубцов; волоски, особенно на тораксе, очень тонкие и длинные, тело коренастое, короткое, мезонотум выпуклый, покатая поверхность эпинотума не кроткая; одноцветно желтый, очень блестящий (♀, ♀, ♂). 4,1—4,6. Средиземноморье; смешивался с предыдущим *A. pallida* Nyl.
- 10(5) Мезонотум приподнят над пронотумом и в профиль выдается угловатым бугром (8). Отношение длины и ширины задней голени 6,0—7,0.
- 11(14) Голова целиком покрыта густыми продольными морщинами, только затылочный край может быть гладким; 2—6-й чл. жгутика усика на $\frac{1}{3}$ длиннее своей ширины. Цвет темно-бурый до черного.
- 12(13) Тело коренастое, скапус короткий, выдается назад за затылочный край головы не более чем на 1,5 своего максимального по-перечника. Вся голова морщинистая. Темно-бурый (8), 5,0—6,5. (♀, ♀, ♂). Кавказ, Субальпика *A. obsidiana* Mayr.