

- 13(12) Тело удлиненное, уплощенное. Скапус тонкий, выдается за затылочный край головы примерно на  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$  своей длины; задние углы головы довольно широко округлены; морщинистость очень густая, голова совсем матовая. 4,3—5,7 ( $\gamma$ ,  $\varphi$ ,  $\delta$ ). Юг Приморья, Южные Курилы (Кунашир). Север и Центр КНР . . . . . *A. sinensis* Wheel.
- 14(11) Голова только в передней трети или половине с морщинками, а в остальном гладкая и блестящая. Красновато-коричневый. Гималаи . . . . . *A. smythiesi* For. ssp. *kurdica* Ruzs. отличается более длинной головой и чл. жгутика (см. таблицу); петиоль более низкий, закругленный; шипы тоньше и длиннее. 5,3—5,8. Восточное Закавказье. Лесной ме-зофил.
- 15(4) 2—6-й чл. жгутика усика в длину не менее чем в 1,5 раза боль-ше, чем в ширину; скапус выдается за затылочный край головы не менее, чем на  $\frac{1}{5}$  своей ширины; отношение длины головы к ширине не менее 1,25; длина скапуса обычно немного больше длины головы.
- 16(17) Темно-коричневый до черного. Бугры мезонотума развиты слабо и в профиль более или менее закруглены. Голова в продоль-ных морщинках. 4,7—6,4. Средиземноморье. У нас 2 подвида . . . . . *A. gibbosa* Latr. ssp. *muschtaidica* Ruzs. Скапус немного более короткий, выдает-ся за затылочный край головы примерно на  $\frac{1}{5}$ ; волоски в его вершинной половине довольно длинные, отстоят под углом 30° (7). Бурый ( $\varphi$ ,  $\varphi$ ,  $\delta$ ). Восточное Закавказье и юг Восточного Предкавказья.  
*ssp. chorassanica* K. Arn. Скапус более длинный, выдается за затылочный край на  $\frac{1}{4}$  своей длины; волоски на скапусе малень-кие, мало приподняты. Почти черный ( $\varphi$ ,  $\varphi$ ,  $\delta$ ). Туркмения, Ко-петдаг.
- 17(16) Красно-желтый или желтый, блестящий, голова с морщинками только впереди, шагренирована, сзади гладкая. Узелок петиоля высокий, вершина заострена. Скапус выдается за затылочный край головы на  $\frac{1}{4}$  своей длины. 4,3—4,8 ( $\varphi$ ). Закавказье . . . . . *A. georgica* K. Arn.
- 18(3) Голова овальная (9), сзади иногда сильнее сужена, чем спере-ди, задние углы совсем не обозначены; усики и ноги очень длин-ные; 2—6-й чл. жгутика усика в 2—2,5 раза (у *festai* в 1,8 раза) длиннее ширины. Скапус выдается за затылочный край головы на  $\frac{1}{5}$  своей длины. Отношение длины и ширины задней голени не меньше 6,3, а обычно гораздо больше.
- 19(20) Отношение длины и ширины 2—6-го чл. жгутика усика около 1,8; торакс более короткий: отношение длины к высоте 2,6. Ши-пы эпинотума маленькие, торчащие выше вверх; узелок пе-тиоля не высокий, коротко закруглен на вершине. Голова густо и мелко морщинистая, матовая. Светло-бурый, брюшко темно-коричневое. 4,5—5,0 ( $\varphi$ ). Турция, Ирак . . . *A. festai* Em.
- 20(19) Тело длинное; 2—6-й чл. жгутика усика не менее чем вдвое длин-нее своей ширины; длина торакса в 3 раза или более превосхо-дит высоту. Голова по крайней мере в задней трети блестящая. Крупнее.
- 21(22) 1-й чл. жгутика усика равен сумме длины 2-го и 3-го чл. Совер-шенно желтого или оранжево-желтого цвета, голова иногда крас-новатая. Голова в передней трети морщинистая, далее шагрени-рована, сзади гладкая; у  $\delta$  она трапециевидная, строение торак-са очень своеобразно ( $\varphi$ ,  $\varphi$ ,  $\delta$ ). 5,4—6,7. Ксерофил, но активен ночью. Средиземноморье. Южный берег Крыма . . . . .