

- *A. splendida* Rog.
 ssp. *transcaucasica* Kagaw. из Талыша отличается несколько более короткими конечностями и чл. жгутика усика (см. таблицу).
- 22(21) 1-й чл. жгутика усика меньше суммы 2-го и 3-го чл. Окраска более темная (лишь у *januschevi* коричневато-желтая).
- 23(26) Голова продольно-морщинистая, гладкими могут быть только темя и затылок.
- 24(25) Петиоль с тонким стебельком (2a), узелок высокий, конический; в профиль передняя и задняя поверхности одинаково круты, постпетиоль угловато-треугольный; шипы эпинотума довольно крупные, направлены почти горизонтально назад. Голова с продольными морщинами, промежутки между которыми шагренированные, матовые, затылочная часть сглажена. Каштаново-коричневый. 6,0—6,6 (♀). Гималаи *A. rothneyi* Fog.
- 25(24) Петиоль более толстый (2b), узелок невысокий, в профиль передняя поверхность его почти отвесная, задняя — более длинная, выпуклая; постпетиоль широко закругленный; шипы эпинотума тонкие, острые, приподняты примерно под углом 45°. Морщинки в передней половине головы нежные, промежутки гладкие, блестящие. Коричневато-желтый. 5,7—7,2. Гиссарский хребет, Кондара *A. januschevi* К. Агп., sp. n.
- Вероятно, к этому виду относятся ♀ и ♂ (Кондара). Передние крылья с почти прямоугольной, не трапециевидной дискоидальной ячейкой.
- 26(23) Морщинки головы слабые, нежные, ограничены передней ее половиной. Очень блестящий, красновато-коричневый, с длинными острыми жесткими волосками. 5,8—6,6. Копетдаг, Бадхыз (♀, рис. Арнольди, 1968б: 1807) *A. fabulosa* К. Агп.
- 27(2) Голова вытянута в задней части и за глазами постепенно почти конически сужена назад наподобие шеи; задних углов совсем нет. Тело и конечности очень длинные. Передние крылья обычно с одной кубитальной ячейкой подрод *Deromyrma* Em. 1-й чл. жгутика усика длиннее 2-го. Передняя часть головы мелко морщиниста. Блестящий каштаново-коричневый. 5,6. Средняя Азия: найден на р. Зеравшан; к этому же виду, очевидно, относятся 2 ♀♀ из Кондары (Гиссарский хребет). ?Афганистан (Писарский) (*Ischnomyrmex* Mayr) *A. (D.) raphidiiceps* Mayr.
- 28(1) Брюшко очень тонко и густо морщинисто, имеет бархатистый вид. Муравьи вытянутые, с длинными конечностями подрод *Aphaenogaster* s. str. Для Закавказья показан Рузским (1905) *A. testaceopilosa* Lucas. Это указание не было с тех пор подтверждено. Упомянутый вид свойствен Западному Средиземноморью, и сейчас невозможно сказать, о каком виде муравьев в современном понимании идет речь, и не было ли ошибки в происхождении материала.

ЛИТЕРАТУРА

- Арнольди К. В., 1948. Муравьи Талыша и Диабарской котловины. Их значение для характеристики ценозов наземных беспозвоночных и исторического анализа фауны, Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 7: 206—262.— 1968. Зональные зоогеографические и экологические особенности мирмекофауны и населения муравьев Русской равнины, Зоол. ж., 47, 8: 1155—1188.— 1968а. Важные дополнения к мирмекофауне (Hymenoptera, Formicidae) СССР и описание новых форм, Зоол. ж., 47, 12: 1800—1822.— 1975. Обзор видов рода *Stenamma* (Hymenoptera, Formicidae) Союза ССР и описание новых видов, Зоол. ж., 55, 3: 1819—1829.
- Рузский М. Д., 1905. Муравьи России: 1—798, Казань.
- Emery C., 1908. Beiträge zur Monographie der Formiciden des paläarktischen Faunengebietes, Deutsch. Entomol. Z.: 305—338.