

sous les tibias. Pubescence presque nulle; un poil couché au fond des fossettes.

D'un noir brunâtre; pattes, antennes et mandibules d'un brun rougeâtre.

Adelaïde (Rothney). Voisin de *punctatum* Sm.

ECTATOMMA (RHYTIDOPONERA) CONVEXUM Mayr var. **spatiatum** nov. var. — ♂ — Se distingue du type par sa sculpture qui, sur la tête et le thorax, est identique à celle de l'*E. Munie*. Les fossettes sont très espacées, les rides du front divergent et s'arrêtent à l'occiput, mais, sur le thorax, les intervalles des fossettes sont striés ou ridés, et non réticulés-punctués. Abdomen très finement et densément strié. Les stries, arquées sur le premier segment, sont plutôt longitudinales sur le second. La crête occipitale est comme chez le type ou un peu plus forte; de même la forme du thorax et de l'écaïlle. La tête est plus fortement tronquée derrière, avec les angles inférieurs de l'occiput plus acuminés, plus dentiformes.

Cette variété rappelle beaucoup la description de l'*E. aciculatum* Sm. qui est incomplète.

Australie méridionale (Froggatt).

Var. **rufescens** nov. var. — ♂. — Long. 7,5 mill. — Plutôt plus petite que la forme typique. Entièrement d'un roux ferrugineux. Abdomen luisant, à stries transversales et faibles sur le second segment. Fossettes moins espacées que chez la v. *spatiatum*, mais plus que chez le type, où elles sont contiguës et réticulaires; leurs intervalles sont réticulés, sur le thorax comme sur la tête. La crête occipitale est extrêmement faible.

Charter. Towers, Queensland oriental (Wiederkehr); Townsville, Queensland (Turner).

Le groupe *convexum*, *nudatum*, *punctatum*, *crisatum*, *socrus*, *scabrum*, *spoliatum*, *Mayri*, joint aux espèces et variétés précédentes, est extrêmement variable et risque de devenir un dédale de races, lorsqu'on disposera d'un plus grand matériel.

Ectatomma (Rhytidoponera) tenue nov. sp. — ♂ — Long. 3,8 à 4,8 mill. — Mandibules striées avec des points épars. Grêle. Tête très allongée, rectangulaire, avec les angles postérieurs très arrondis. Pas trace de crête, ni d'espace prolongé à sculpture faible pour les scapes. Yeux hémisphériques, situés au milieu des côtés de la tête. Scapes très longs, dépassant le bord occipital de la tête d'un quart de leur longueur. Thorax fortement convexe d'avant en arrière, métanotum inclus, plus convexe que chez l'*E. metallicum*. Nœud du pédicule subcubique, comme chez *metallicum* et *Victorieæ*, mais moins épais et moins anguleux au sommet que chez *metallicum* et même que chez *Victorieæ*, plus abaissé en haut devant et plus