

L'ensemble de ces différences, dont chacune est bien peu marquée, constitue une race nouvelle de ce groupe presque inextricable. J'en déplore la naissance sans pouvoir l'empêcher.

Mackay, Queensland (Turner).

PONERA COARCTATA Latr., var. **mackayensis** nov. var. — ♀. — D'un rouge brunâtre ou d'un brun rougeâtre avec le thorax et les extrémités rougeâtres. Diffère du type par son écaille plus épaisse et plus basse, son thorax plus étroit et plus allongé, avec la suture méso-métanotale peu distincte. Les côtés de la tête sont un peu plus convexes et sa ponctuation plus faible, de sorte qu'elle est assez luisante. La pubescence adjacente est aussi plus abondante.

Mackay, Queensland (Turner).

Ponera queenslandensis nov. sp. — ♀. — Long. 3,5 à 3,6 mill. — Mandibules bien plus longues que chez la *luteipes*, étroites, lisses, luisantes, avec quelques points vers l'extrémité, armées de 7 dents espacées, larges et peu distinctes, avec une ou deux dentelures très indistinctes entre deux. Épistome un peu avancé au milieu de son bord antérieur, légèrement déprimé derrière l'avancement, convexe ou subcaréné au milieu, derrière cette portion déprimée. Les yeux ont 8 facettes et sont situés au quart antérieur de la tête. Tête subrectangulaire, un peu plus large derrière que devant, à côtés faiblement, mais distinctement convexes, échancrée derrière. Les scapes dépassent légèrement l'occiput. Articles 3 et 4 des funicules légèrement plus épais que longs, les autres plus longs qu'épais. Sutures du thorax très distinctes; forme du métanotum comme chez la *trigona*, mais pas comme chez la *luteipes* ni comme chez la *Jerdonii*. Écaille analogue à celle de la *P. coarctata*, mais plus haute et plus mince, comme chez la *distinguenda* Emery. Abdomen faiblement contracté après le 1^{er} segment.

Luisante; tête subopaque. Sculpture analogue à celle de la *trigona r. convexiuscula*, mais la pubescence est bien plus éparse. Pilosité dressée très éparse, presque nulle.

Tête brune. Thorax d'un brun un peu rougeâtre. Épistome, antennes, pattes, écaille et abdomen d'un roux plus ou moins jaunâtre; extrémité de l'abdomen d'un jaune à peine roussâtre.

♀. Long. 3,8 mill. — Thorax plus étroit que la tête. Face déclive du métanotum plane, tronquée, très luisante, nettement bordée. Écaille haute, assez mince, mais à bord supérieur arrondi. Yeux fort gros. Écaille et abdomen entièrement d'un jaune roussâtre. Ailes faiblement teintées de brunâtre, avec la tache et les nervures brunes.

Mackay, Queensland (Turner). Ressemble à la *distinguenda* Em.,