

dont elle diffère par ses longues et étroites mandibules, par ses antennes plus grêles et par le manque de dent à la pièce latérale du mésonotum.

PONERA TRUNCATA Smith, var. **elliptica** nov. var. — ♀. — Long. 4,5 mill. — Diffère du type décrit par Smith et Mayr par son écaille ovale-elliptique, à côtés fort convexes et à bord presque tranchant. Chez le type les côtés de l'écaille sont subparallèles. Va du reste fort bien à la description.

♂. Long. 4 à 4,4 mill. — Les yeux, situés au quart antérieur de la tête, n'ont que 4 à 5 facettes. Couleur et caractères de la ♀. Très semblable à la *queenlandensis* pour les mandibules, mais l'épistome a, comme chez la ♀, une carène bifurquée devant où l'épistome est légèrement échancré au milieu de son bord antérieur et canaliculé derrière l'échancrure. Les côtés de la tête sont plus convexes que chez la *queenlandensis*, les funicules un peu plus épais, le thorax plus convexe d'avant en arrière, l'écaille plus mince à son bord supérieur et plus large, ovale-elliptique. Abdomen à peine contracté après le 1<sup>er</sup> segment. Elle est plus abondamment et plus finement pubescente que la *P. queenlandensis*; la pubescence forme un fin duvet grisâtre. Elle est enfin plus grande et plus robuste.

PONERA MELANARIA Emery, r. **australis** nov. st. — ♂. — Long. 6,5 à 6,8 mill. — Mandibules luisantes, faiblement chagrinées vers la base, un peu moins longues et un peu moins concaves au bord extérieur que chez la forme typique. Les yeux ont environ 34 à 35 facettes (54 à 55 chez la forme typique). La tête a les côtés moins convexes; le sillon frontal ne se prolonge pas aussi en arrière. Le profil de la face basale du métonotum est plus rectiligne et le mésonotum, plus élevé, forme avec lui une plus forte échancrure. L'écaille a le bord plus épais et plus obtus. La couleur est d'un brun rougeâtre, avec les pattes, les antennes, les mandibules et l'extrémité de l'abdomen roussâtres ou rougeâtres. Le corps entier est moins prumineux (moins pubescent), plus luisant.

Mackay, Queensland (Turner).

PONERA (BOTHROPONERA) SUBLIVIS Em., r. **reticulata** nov. st. — ♂. — Long. 14 à 16,5 mill. — Diffère de l'espèce typique par la sculpture de la tête et du thorax qui est composée de grosses réticulations aréolaires, irrégulières, souvent interrompues, surtout sur le thorax. Les réticulations ne sont pas profondes, mais leurs mailles fort grandes. Le fond des mailles est partout très densément et finement réticulé-punctué et mat, de même que tout l'abdomen qui n'a pas trace de sculpture grossière. Une pubescence rousse ou rougeâtre est répandue partout et assez dense sur l'abdomen où elle forme une fine pelisse. La pilosité dressée est très courte et