

tement proéminent en bosse subconique (arrondi en calotte de sphère chez la *sublaevis r. reticulata*) Nœud du pédiculé épais, fortement convexe devant et dessus, verticalement tronqué derrière (surface tronquée très luisante), tandis que chez la *reticulata* le nœud est faiblement convexe à sa face postérieure. Ailes plus longues et plus jaunâtres que chez la *reticulata*. Tête, pronotum et mésonotum densément réticulés-punctués et mats. Le reste fortement punctué et luisant.

Mackay (Queensland), Turner.

PONEUA (BOTHROPONERA) EXCAVATA Emery, var. **acuticostata** nov. var. — ♀. — Diffère de l'*excavata* (d'après la description d'Emery) par le pédicule et le premier segment de l'abdomen qui sont sillonnés de fortes côtes absolument régulières, comme chez la *B. porcata*, plus fortes que chez la *piliventris* et la *rufipes*, surtout plus serrées. Le 2° segment abdominal n'a pas de côtes; il est densément, finement et irrégulièrement réticulé-punctué et mat, comme le reste du corps, sauf les sommets luisants des très grossières rides ou réticulations de la tête et du thorax. Le nœud du pédicule est fort large et largement échancré d'un bout à l'autre de son bord supérieur-postérieur.

Queensland (ma coll.).

PONERA (BOTHROPONERA) MAYRI Em. — ♂. — Long. 12,5 mill. — Tête entièrement brune. Du reste identique à celui de *B. piliventris v. intermedia* et très différent de celui de la *sublaevis r. reticulata*.

LEPTOGENYS (LOBOPELTA) FALLAX Mayr, *r. fortior* nov. st. — ♀. — Long. 6,5 mill. — Couleur plus foncée que chez le type, d'un brun clair. Tête large, un peu plus large que longue, fortement échancrée derrière, à côtés convexes (chez la *L. fallax* i. sp., elle est rectangulaire, plus longue que large, à côtés subparallèles, faiblement convexes et moins échancrée derrière). La courbe qui sépare les deux faces du métanotum est moins abrupte; la face déclive est moins abrupte aussi. L'écaille est plus mince et plus haute, bien plus squamiforme. Les yeux sont légèrement plus grands (de 40 à 50 facettes), mais très plats et à facettes petites et peu distinctes (de 30 facettes à peine chez le type de l'espèce).

♂. Long. 6 à 6,5 mill. — Fort semblable à celui de l'*ocellifera*, mais le scape un peu plus court. D'un jaune roussâtre testacé. Ailes pubescentes, subhyalines, à nervures et tache brunes. Du reste comme celui du type de l'espèce.

Cairns, Queensland (Nugent). Envoyé par M. G. Turner. Ressemble beaucoup à première vue à la *L. birmana* Forel (Ponérides de l'Inde. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1900), mais s'en distingue