

par ses petits yeux (la *birmana* a au moins 150 à 200 facettes plus grandes et bien développées et les yeux convexes), ainsi que par sa taille plus petite.

LEPTOGENYS (LOBOPELTA) CONIGERA Mayr, *r. mutans* n. st. — ♀. — Long. 10 à 11 mill. — Diffère de l'espèce typique, dont elle a la taille, par un fort reflet bleuâtre identique à celui de la *L. chinensis*, par sa taille plus grêle, ses scapes dépassant l'occiput de presque un tiers de leur longueur ($1/5$ chez la forme typique), sa tête rétrécie derrière, plus étroite derrière que devant (plutôt plus large chez la forme typique), son mésonotum extraordinairement court, formant une bande transversale quatre fois plus large que longue, sa suture méso-métanotale distincte et son pédicule encore plus étroit. Les yeux sont situés aussi un peu plus en arrière, près du milieu des côtés de la tête.

Mackay, Queensland (Turner).

LEPTOGENYS (LOBOPELTA) CONIGERA Mayr, *r. Adlerzi* nov. st. — ♀. — Long. 6,4 à 7,5 mill. — Diffère de la forme typique, à laquelle elle ressemble énormément, sauf pour la taille, par ses antennes dont le scape dépasse l'occiput de $1/8$ à peine de sa longueur et par les articles 8 à 10 du funicule aussi larges que longs (plus longs que larges chez le type de l'espèce). Pas de reflet. La suture méso-métanotale est obsolète, à peine indiquée. Le nœud du pédicule est seulement deux fois plus long que sa largeur postérieure (plus long chez le type et surtout chez la race *mutans*). Pilosité un peu plus fine et moins abondante que chez le type.

Townsville, Queensland (Turner) et Charter Towers, Ost Queensland (Wiederkehr). Chez ces derniers exemplaires, le nœud du pédicule est plus élevé, surtout devant.

On peut dire que la forme typique, décrite par Mayr, est intermédiaire entre les races *mutans* et *Adlerzi* qui, si on ne la connaissait pas, devraient constituer deux espèces.

Leptogenys (Lobopelta) magna nov. sp. — ♀. — Long. 13 à 14,5 mill. — Grêle, très voisine de la *conigera*. Mandibules lisses, luisantes, abondamment ponctuées, avec le bord terminal très long, beaucoup plus long que le bord interne, indistinctement denticulé d'un bout à l'autre (plus court que le bord interne et muni en avant de trois fortes dents chez la *conigera* et ses races). Yeux grands, situés au milieu des côtés de la tête. Celle-ci rectangulaire arrondie, d'une idée plus large devant que derrière, où elle est un peu rétrécie par la convexité de ses côtés qui sont fort peu convexes devant. Les scapes dépassent l'occiput d'un bon tiers. Les articles des funicules sont tous bien plus de deux fois plus longs que larges (chez la *conigera* les articles 6 à 10 sont moins de deux fois plus longs que