

(type *chinensis*), un peu plus long que sa largeur postérieure. Abdomen nettement contracté après son 1<sup>er</sup> segment.

Lisse et luisante, avec une ponctuation très fine et très éparse, piligère. Pilosité dressée jaunâtre, très courte, très fine, médiocrement abondante, éparse sur le thorax et les pattes. Pubescence éparse.

D'un brun de poix. Extrémité de l'abdomen, scapes, mandibules et pattes roussâtres.

Mackay, Queensland (Turner).

Bien distincte par les dents du métanotum.

**Leptogenys Turneri** nov. sp. — ♀. — Long: 10 à 11 mill. — Les mandibules, longues et étroites à leur base et jusqu'après leur milieu, laissent un espace entre elles et l'épistome, puis s'élargissent en se courbant en dehors, de sorte que leur bord externe est fortement concave ou forme un angle rentrant, arrondi. Elles forment une sorte de bord terminal tranchant, obliquement tronqué, dont la limite est marquée par une dent minuscule et un angle fort obtus. Elles sont luisantes, irrégulièrement striées, avec des points épars. Épistome caréné, avancé en lobe tout à fait arrondi et fortement dentelé à son bord antérieur; il a environ 11 dents. Les scapes dépassent l'occiput de près des  $\frac{2}{5}$  de leur longueur. Yeux très gros et très convexes. Pas d'ocelles. Tête en trapèze, fort rétrécie derrière, à côtés peu convexes, à bord postérieur non échancré. Sa longueur dépasse à peine sa largeur antérieure. Le mésothorax est fortement resserré comme dans le genre *Acantholepis*; le pronotum est ovale, avec les côtés et le dos fort convexes. Mésonotum petit, en disque aussi long que large. Vu de profil, une forte échancrure mésonotale, très profonde, mais évasée. Métanotum convexe, rétréci devant, élargi derrière; la face basale passe insensiblement à la face déclive par une convexité bien arrondie. Nœud du pédicule rétréci devant, élargi et tronqué derrière, arrondi de profil en une courbe élégante et très convexe d'avant en bas en dessus derrière. Cette courbe constitue presque une arête tranchante située entre les deux faces latérales comprimées et se termine derrière, au haut de la surface postérieure verticalement tronquée, par une forte pointe ou épine un peu courbée, dirigée en arrière et en haut, longue de 0,35 mill. et pas très aiguë. L'abdomen n'est nullement resserré après son premier segment. Le nœud du pédicule est  $1 \frac{1}{2}$  fois plus long que large, distinctement pétiolé devant.

Épistome ridé en long. Tête et côtés du mésonotum très grossièrement et profondément réticulés rugueux, avec des rugosités plus fines au fond des mailles, assez luisants. Thorax et pédicule très grossièrement ridés et assez luisants. Les rides sont circulaires sur le devant et les côtés du pronotum, longitudinales dès le milieu du