

qui s'interrompt le long du mésonotum, mais se continue le long de la face déclive du métanotum et le long des côtés du pronotum, devant et en bas, pour remonter encore le long du bord antérieur de la pièce latérale du mésonotum, mais s'arrêter avant d'avoir rejoint l'extrémité postérieure du dos du pronotum. A l'extrémité antérieure latérale du dos du pronotum, cette arête forme un angle assez distinct, et à la limite des deux faces du métanotum une petite dent. Les faces basale et déclive du métanotum sont séparées dessus par une courbe douce. Nœud du pédicule cubique, élargi devant, plus large que long, déprimé dessus, tronqué devant et derrière, bordé latéralement en haut d'une arête vive, horizontale, qui se continue devant en descendant le long des côtés du nœud, et derrière en formant deux fortes dents lamelliformes, convergentes, dirigées en arrière et en haut, analogues à celles du *C. Mayri*. Abdomen fortement resserré après son 1^{er} segment; ce dernier bordé en haut, latéralement, d'une arête sur les 2/3 de sa longueur et creusé sur le côté d'une concavité longitudinale. Second segment à peine un peu plus grand que le premier.

Lisse et très luisant. Front finement réticulé-punctué devant et de côté. Joues irrégulièrement et grossièrement rugueuses. Des points très épars, plus gros et plus abondants sur l'abdomen.

Pilosité dressée, roussâtre, assez longue, grossière et pointue, assez espacée, mais partout, aussi sur les pattes et les scapes. Pubescence adjacente extrêmement rare.

Roussâtre. Pattes, funicules, les arêtes décrites ci-dessus et quelques bandes très nuageuses sur l'abdomen brunâtres.

Australie méridionale. Reçu par M. Wroughton. Cette singulière espèce se rattache au groupe du *C. Mayri* Forel, de Madagascar.

Sphinctomyrmex Turneri nov. sp. — ♀. — Long. 7,3 à 8,5 mill. — Mandibules tranchantes, luisantes, densément punctuées. Arêtes frontales comme chez le *C. Emeryi*, et se recourbant aussi devant pour border la fossette antennaire; mais elles ne se continuent pas loin du côté interne des arêtes des joues, et ne forment pas une seconde arête parallèle intérieure; les arêtes des joues sont fort élevées et courbées en dedans à leur extrémité postérieure. Tête rectangulaire arrondie, fortement et largement échan-crée derrière, légèrement plus longue que large, à côtés convexes. Des yeux assez gros ayant près d'une centaine de facettes et situés au milieu des côtés. Antennes épaisses de douze articles. Les scapes atteignent le tiers postérieur de la tête. Articles des funicules plus épais que longs, sauf le deuxième et le dernier. Thorax à peine deux fois plus long que large, arrondi en tout sens, avec la face déclive du métanotum tronquée et bordée d'une arête de côté et en haut. Pronotum bordé devant (en haut et de côté) d'une petite arête.