

basale du métanotum. Face déclive du métanotum lisse, luisante, bordée de côté et en haut d'une arête qui se relève un peu à la place où sont ordinairement les épines métanotales. Nœud du pédicule cubique-arrondi, aussi long que large, armé en dessous d'une grosse dent obtuse.

Premier segment de l'abdomen conformé comme chez le *S. Froggatti*, à peine plus resserré derrière; les suivants plus transversaux. Pygidium absolument entier, seulement subtronqué, bordé de *spinules* de chaque côté.

Luisant. Tête, thorax et pédicule abondamment criblés de fossettes dont le fond est ombiliqué au milieu et qui sont en général piligères. Abdomen fortement et abondamment ponctué. Les fossettes de la tête sont très rapprochées.

Pilosité jaunâtre, pointue, assez longue, assez abondante, passant à la pubescence qui est assez longue, plutôt grossière et de même couleur, ne cachant nulle part la sculpture, mais assez abondante sur l'abdomen.

D'un brun foncé. Mandibules, antennes, joues et cuisses d'un brun roussâtre. Bord postérieur et latéral des segments abdominaux, pygidium et dernier article des funicules roussâtres. Tibias et tarses d'un jaune roussâtre.

Mackay, Queensland (Turner).

Cette espèce est bien caractérisée par ses yeux et ses ocelles. J'en ai 19 ♂, toutes conformées de même, de sorte qu'il ne s'agit probablement pas d'une ♀ ergatomorphe ou plutôt d'une ♂ gynécoïde de l'espèce suivante. Cependant c'est une possibilité à laquelle il faut penser.

Sphinctomyrmex (Eusphinctus) fallax nov. sp. — ♂. — Long. 3 à 3,6 mill. — Pas d'yeux, ni d'ocelles. Extrêmement semblable au *S. Steinheili* dont il diffère encore par les caractères suivants. Plus grêle. Tête plus allongée et plus rectangulaire, à côtés moins convexes. Scapes légèrement plus longs; funicules un peu moins épais, leur 1^{er} article aussi long que large. Thorax un peu plus étroit; suture pro-mésnotale entièrement obsolète. Nœud du pédicule plus long que large. Tous les segments abdominaux plus longs et plus étroits; le premier beaucoup moins élargi derrière, plus semblable à un 2^e nœud de pédicule, comme chez le *C. Emeryi*. Fossettes plutôt plus serrées (presque réticulaires) sur l'occiput, mais plus espacées sur les joues, le thorax et le pédicule. Pilosité un peu plus courte. Pubescence moins forte sur l'abdomen. Entièrement roussâtre; cependant quelques exemplaires ont exactement la couleur du *Steinheili*.

Diffère du *S. Emeryi* par ses antennes de 11 articles, plus courtes