

et plus robustes, par les arêtes des joues, la forme de la tête, le nœud non tronqué, la *pubescence* moins forte et les fossettes ombiliquées. La *r. clarus* de l'*Emeryi* a le nœud analogue, mais plus court.

Mackay, Queensland (Turner).

Reçu dans un autre envoi et sous un tout autre numéro que le précédent. 21 ♀ ne diffèrent les unes des autres que par la couleur. Est-ce peut-être cependant une forme ♀ polymorphe du *Steinheili*? Un cas analogue chez la *Ponera Eduardi* doit rendre circonspect.

***Ænictus aratus* nov. sp.** — ♀. — Long. 3,3 à 3,5 mill. — Mandibules fort convexes, subopaques, finement réticulées, très finement denticulées à leur bord terminal qui a en outre une dent plus forte avant la dent apicale. Les arêtes frontales convergent en arrière, mais elles ne se soudent qu'assez loin en arrière de l'insertion des antennes. La fossette antennaire est profonde derrière, entre les arêtes frontales et celles des joues. Ces dernières très distinctes, longues, convexes en dehors, s'étendant en arrière presque jusqu'au milieu de la longueur de la tête. Tête ovalé-rectangulaire, plus arrondie derrière, où elle n'est nullement échancrée, légèrement plus large devant que derrière, plus longue que large, à côtés peu convexes. Sillon frontal à peu près distinct, surtout en arrière. Les scapes n'atteignent pas le bord occipital. Articles 2 à 6 du funicule élargis à l'extrémité, à peu près aussi larges que longs. La forme du thorax tient le milieu entre le *leviceps* et le *bengalensis*; le pronotum forme avec le mésonotum une faible convexité longitudinale suivie d'une légère dépression. La face déclive du métanotum est séparée de la face basale par une petite arête transversale, relevée, arrondie de chaque côté, et se continuant sur les côtés de la face déclive. Premier nœud du pédicule 1 1/2 fois plus long que large, nullement pétiolé, faiblement subbordé en haut, rapidement abaissé à son quart antérieur, tronqué derrière, muni en dessous d'un tubercule arrondi. Second nœud plus long que large, faiblement élargi derrière. Cuisses et tibias renflés vers leur extrémité, comme chez l'*A. bengalensis*.

Tête, thorax et pédicule finement et densément réticulés-ponctués et mats. Pattes et scapes finement réticulés et subopaques. Abdomen lisse et luisant; le thorax est en outre parsemé et comme labouré de grossiers sillons irréguliers et de grosses fossettes allongées, aussi irrégulières, tous avec une direction plus ou moins longitudinale.

Pilosité longue, pointue, espacée, roussâtre, un peu oblique sur les tibias et les scapes. Pubescence adjacente presque nulle.

Brun. Mandibules, pédicule, base des cuisses et des tibias d'un brun roussâtre ou d'un roux brunâtre. Antennes, joues, côtés de