

la tête, le reste des pattes avec les hanches et l'extrémité de l'abdomen roussâtres (ferrugineux sur les parties mates).

Mackay, Queensland (Turner).

Tient un peu le milieu entre l'*Æ. bengalensis* et l'*Æ. Aitkenii* Forel in litt. de l'Inde que je décrirai prochainement.

***Ænictus Turneri*** nov. sp. — ♀. — Long. 2,4 à 2,5 mill. — Mandibules luisantes, avec des points épars et quelques fines stries éparses, à bord externe peu convexe et à bord terminal armé de deux dents assez obtuses, outre l'apicale. Arêtes frontales très rapprochées à la hauteur de l'articulation des antennes, puis divergeant en arrière, et se terminant très peu après. Pas de sillon frontal. Fossettes antennaires non prolongées en arrière. Arêtes des joues rudimentaires et interrompues. Les scapes atteignent environ le tiers postérieur de la tête; les articles des funicules sont un peu plus longs que larges, sauf l'antépénultième qui est aussi large que long. Tête ovale-rectangulaire, plus large devant que derrière, à bord occipital à peu près droit. Thorax faiblement, mais distinctement échancré entre le mésonotum et le métanotum; le pronotum et le mésonotum forment une convexité; la face basale du métanotum forme une seconde convexité plus faible. Extrémité inférieure latérale du pronotum anguleuse. Face déclive du métanotum très petite, triangulaire, bordée d'une petite arête non relevée en haut. Les deux nœuds du pédicule arrondis, de même épaisseur, un peu plus longs que larges. Le premier nœud a en dessous un appendice comprimé, rectangulaire, comme coupé à son extrémité inférieure qui est aussi large que sa base. Le second nœud a devant, en dessous, une petite dent dirigée en avant. Tibias et cuisses fort atténués vers la base et renflés vers l'extrémité.

Lisse et luisant. Métanotum, premier nœud du pédicule, extrémité postérieure du mésonotum et base du second nœud du pédicule réticulés-ponctués et à peu près mats.

Pilosité jaunâtre, fine, disséminée partout, un peu oblique sur les tibias et les scapes. Pubescence presque nulle.

D'un jaune roussâtre ou d'un roux jaunâtre clair. Abdomen jaunâtre. Antennes d'un jaune brunâtre. Pattes d'un jaune sale.

Mackay, Queensland (Turner).

Voisin de *ceylanicus* et *peguensis*, mais plus grêle que le premier. Les nœuds du pédicule ont une autre forme que chez le *peguensis*.

#### APPENDICE.

***Ænictus cornutus*** nov. sp. — ♀. — Long. 3,7 à 3,9 mill. — Mandibules luisantes, très finement chagrinées, avec une dent outre la dent terminale, du reste microscopiquement denticulées. Arêtes