

frontales rapprochées entre les articulations des antennes, puis divergeant fortement derrière, courtes. Fossette antennaire non prolongée en arrière. Arête des joues à peu près obsolète, sauf son extrémité antérieure qui forme une éminence dentiforme. Tête ovale-rectangulaire, comme chez l'*Æ. Turneri*, mais le bord articulaire de l'occiput un peu relevé et formant un angle de chaque côté. Les scapes atteignent le bord occipital. Articles du funicule fortement renflés à l'extrémité et rétrécis à la base, un peu plus longs que larges. Pronotum armé devant, en dessus, de deux fortes dents ou cornes, dirigées en avant, en dehors et en haut, épaisses, fort obtuses à l'extrémité, droites, un peu plus longues que la largeur de leur base. Le thorax, largement échancré, a du reste la même forme que chez le *laeviceps*, mais la face basale du métanotum est plus également convexe. L'arête qui borde la face déclive est relevée en haut, comme chez l'*aratus*. Les deux stigmates situés de chaque côté du milieu de la face basale proéminent un peu comme deux dents ou oreilles. Nœuds du pédicule allongés, deux fois plus longs que larges, arrondis en dessus, armés chacun en dessous d'une petite dent dirigée en avant. Abdomen atténué à son extrémité antérieure. Cuisses et tibias peu renflés; pattes longues.

Lisse et luisant. Mésonotum, métanotum et pédicule assez grossièrement et irrégulièrement ridés en long, et en outre très finement réticulés-punctués, mats ou subopaques. Quelques grosses fossettes très éparses se trouvent surtout entre les cornes du pronotum.

Pilosité dressée longue, fine, jaunâtre, pointue, assez disséminée partout, aussi sur les pattes et les scapes. Pubescence presque nulle.

Noir. Abdomen d'un brun foncé, avec l'extrémité plus claire. Mandibules, antennes et pattes brunes, avec les articulations d'un brun roussâtre. Une tache ovale d'un jaune à peine roussâtre de chaque côté de l'occiput, comprenant plus du quart postérieur du côté de la tête.

Sarawak, Bornéo (Haviland).

Ænictus Binghamiri nov. sp. — ♀. — Long. 4,2 à 4,6 mill. — Très voisin de l'*Æ. laeviceps* Sm., mais plus grand, avec les côtés de la tête bien plus convexes, le deuxième article du funicule aussi long que le premier et au moins deux fois plus long que large, ainsi que les suivants. Métanotum à peine convexe. Epine du premier nœud du pédicule plus longue. Premier segment de l'abdomen bien plus fortement atténué à sa base qui est colliforme. Thorax, pédicule et cou de l'abdomen entièrement réticulés; le pronotum et le pédicule subopaques; le reste du thorax réticulé-punctué et mat,