

26) *Leptothorax mauritanicus* Santschi, 1909. – Décrit d'Essaouira (ex-Mogador) ; retrouvé près de cette localité, en forêt de la Mamora et aux environs de Fes.

27) *Leptothorax bucheti* Santschi, 1909. – Décrit des environs de Tanger ; la « variété » *mixtus* Santschi, 1929 est citée de Zueret (?). Non retrouvé par nous au Maroc. Nous le connaissons par contre du Massif de l'Ouarsenis (Algérie) (*L. bucheti* st. *tuneticus* var. *tellensis* Santschi, 1939, *non valide* ; décrite de Bordj el Emir Abdelkader, ex-Trolard-Taza), près de Teniet el Had (CAGNIANT, 1973 : 316).

Remarques. – On notera que les caractères proposés pour les mâles dans la clé proviennent de cette colonie. Tunisie (ssp. *tunetica* Santschi, 1918) décrite avec les trois castes des environs du Kef. Une var. *festai* est citée de Cyrénaïque par EMERY (1924 : 8). D'après ces références, *L. bucheti* apparaît comme une forme rare, à distribution discontinue ; sa persistance au Maroc reste à confirmer.

28) *Leptothorax turritellus* Espadaler, sp. n.

Matériel type. – **Holotype** ouvrière, Azegour, au dessus d'Amez Miz (Haut Atlas de Marrakech), matorral à Chênes verts, 1600 m, 2-05-1990. **Paratypes** : 5 reines, 10 mâles, 20 ouvrières, mêmes références (reines et mâles obtenus ultérieurement en élevage).

Description. – **Ouvrière.** *Long.* : 3,8-4,8 mm. Noire, pattes et mandibules brun jaune plus ou moins foncé. Tête, tronc et pétioles ornés de fortes rides longitudinales anastomosées par places, interrises luisants, réticulation indistincte. Tête rectangulaire (*Lte/lat* : 1,29-1,35), suture métanotale un peu enfoncée, la face dorsale du propodéum remontant derrière elle (fig. 28). *Ind ép.* : 1,40-1,70.

Reine. *Long.* : 6,0 mm. Couleur et ornementation de l'ouvrière ; scutum ridé en long, seules ses marges restent lisses ainsi que la moitié postérieure du scutellum.

Mâle. *Long.* : 3,0-3,4 mm. Noir, les appendices brun clair. Tête, tronc et pétioles réticulés avec des rides très fines apparaissant sur la tête, le scutum et les noeuds. Scape moyen (*Lsc/lat* : 0,48-0,52) ; articles du funicule d'1/5 à 1/4 plus longs que larges. Propodéum tombant presque à la verticale mais pourvu de denticules médiaires. Plaque sous-génitale aussi haute que large à sa base ; digitus volsellaire très recourbé ; beccus fort et incurvé (fig. 63).

Derivatio nominis. – Par allusion à la tourelle surmontant l'entrée du nid.

Répartition. – Un seul nid connu. L'ouverture du nid, creusé en pleine terre, était surmontée d'une sorte de tourelle conique façonnée avec les poils d'une Labiée (peut-être un *Teucrium*).

29) *Leptothorax ditifet* Espadaler, sp. n.

Matériel type. – **Holotype** ouvrière, « Monument de la Légion », Bab-n-Ouayâd, route du lac Tisli, au dessus de Tassents, Haut Atlas central ; rocaille vers 2300 m, 14-05-1987. **Paratypes** : 5 reines, 10 mâles, 20 ouvrières, mêmes références (reines et mâles obtenus ultérieurement en élevage).

Description. – **Ouvrière.** *Long.* : 3,4-3,9 mm. Noir profond ; tarses, articulations, bords des mandibules brun jaunâtre. Tête, tronc et pétioles submats, densément réticulés ; le dessus de la tête porte quelques rides en éventail, le thorax est parcouru de rides confuses en larges mailles, plus serrées et plus fines sur les noeuds ; gastre luisant. Tête d'un quart plus longue que large (*Lte/lat* : 1,22-1,27) ; dépression métanotale ample mais peu profonde ; épines longues et recourbées (*Ind. ép.* : 1,80-2,12) ; noeud du pétiole aplati au sommet (en vue de profil, fig. 29) ; assez étroit en vue de dessus ; postpétiole globuleux.

Reine. *Long.* : 5,6-5,9 mm. Couleur et ornementation de l'ouvrière ; scutum et scutellum régulièrement ridés en long, de même que les noeuds ; sommet du pétiole plat comme chez l'ouvrière.

Mâle. *Long.* : 2,9-3,3 mm. Noir, pattes et antennes brun jaune, mandibules jaunes. Tête finement réticulée avec quelques rides ténues allant en s'écartant vers les joues ; alitrone et pétioles superficiellement réticulés, devenant lisses sur les marges du scutum, sur le scutellum et le dessus du postpétiole. Scape plus grand que chez les autres espèces du groupe (*Lsc/lat* : 0,62-0,70), premiers articles du funicule d'un tiers plus long qu'épais ; beaucoup d'individus présentent de petits denticules médiaires (fig. 38). Plaque sous-génitale un peu plus large que haute ; digitus de la volselle pédonculé, grêle et recourbé ; beccus petit, mais aigu et incurvé (fig. 64).