

Alta didita Walk. 2—3 l.

*Pseudomyrma atrata* Smith.

— ? *allaborans* Walk. 3 l.

*Cremastogaster forticulus* Walk.  $1\frac{3}{4}$  l.

*Cremastogaster apicalis* Motsch.

♀ *Ferrugineo-testaceus, subopacus, abdomine nitido, postice infuscato, oculis nigris; capite subrotundato, opaco, medio substriguloso-rugoso, postice rugoso-punctato, oculis minutis, subprominulis; thorace capite angustiore, elongato, supra deplanato, scabroso, antice dilatato, medio coarctato, postice subconcavo, bispinoso producto; petioli nodo antico dilatato, scutelliforme excavato, postico transversim-globoso, bilobato; abdomine triangulare, apice subelevato.*

Long.  $1\frac{1}{3}$  l. — lat. cap.  $\frac{2}{5}$  l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Il y a une espèce très-voisine un peu plus large sur le continent indien, mais chez elle l'abdomen est plus arrondi et presque tout noir, le corselet finement ponctué et les épines moitié plus courtes. Il l'ai nommée *Cr. abdominalis*.

*Cremastogaster brunnescens* Motsch.

*Subopacus, sparsim pilosus, fusco-brunneus, antennarum clava, tibiis tarsisque dilutioribus, abdomine elongato-triangulari, nitido, nigro, fusco-piloso; capite subquadrato, angulis rotundatis, opaco, medio substriguloso, fronte convexa, antice linea nitida longitudinali, inter antennas impressa, clypeo substrigoso, medio subcarinato, nitido; thorace capite angustiore, elongato, attenuato, medio coarctato.*