

5. *Form. uralensis* Ruzsky. ♀. Видъ этотъ, впервые найденный мной въ 1894 г. въ южномъ Уралѣ, оказался широко распространенъ по всей южной Сибири, какъ въ степяхъ на равнинѣ, такъ въ горахъ (Алтай).

6. *Form. exsecta* Nyl. ♀.

7. *Form. pressilabris* Nyl. ♀. Оба вида найдены и въ Монголіи.

8. *Form. fusca* Linn. ♀. Найденъ также въ Монголіи.

9. *Form. rufibarbis* Fabr. ♀. Также свойственна и Монголіи.

Subsp. *clara* For. ♀. Менѣе типична, чѣмъ въ Туркестанѣ и на Памирѣ.

10. *Form. cinerea* Mayr.

Var. *imitans* Ruzsky. ♀.

11. *Form. gagates* Latr. ♀. Имѣются переходныя формы къ *transcaucasica* Nass.

12. *Form. sanguinea* Latr. ♀. Отличается довольно яркой окраской тѣла (грудь и ножки) по сравненію съ экземплярами изъ Россіи: основаніе и конецъ брюшка красные. Найденъ также въ сѣв. Монголіи.

Var. *mollesonae*, nov. ♀.

♀. *Metanotum* mehr oder weniger regelmässig gerundet, so dass seine Basalfläche fast ebenso geneigt ist, wie die abschüssige; beide Flächen sind beinahe gleich und der Winkel, den sie bilden, ist stumpf gleichmässig gerundet (bei der typischen Form ist er spitzer und tiefschärfer hervor, während die Basalfläche des *Metanotum* flacher und länger ist als die abschüssige). Kiefertaster etwas länger als bei der typischen Form. Färbung des Körpers dunkler. — Länge $4\frac{1}{2}$ —5 mm.

Fndt.: Umgeb. von Tschita in Transbaikalien (Ost-Sibirien).

Отличается отъ типичной *F. sanguinea* болѣе темной окраской, меньшей величиной и строеніемъ торакса. Цв. коричнево-красныя на груди проступаютъ темноватыя пятна. На головѣ чернотупое пятно, занимающее почти всю его верхнюю поверхность. Заднеспинка болѣе или менѣе правильно закруглена, при чемъ основная ея поверхность почти такъ-же поката, какъ и наклонная; у болѣе крупныхъ экземпляровъ эта поверхность нѣсколько болѣе плоская и имѣетъ посрединѣ слѣды поперечнаго углубленія, которое у типичныхъ формъ изъ Европы и Россіи всегда хорошо развито и лежитъ посрединѣ плоской основной поверхности заднеспинки. У var. *mollesonae* обѣ поверхности заднеспинки (основная и наклонная) равныя почти равныя, и уголь, образуемый ихъ пересѣченіемъ, тупой, неправильно закругленный; у типичной же формы онъ болѣе острый рѣзче выдается, вслѣдствіе того, что основная поверхность длиннѣе наклонной и болѣе полого. Очень рѣдкіе отстоящіе волоски разбросаны на нижней поверхности тѣла и кое-гдѣ на верхней брюшка. Прилегающіе волоски, въ общемъ, какъ у типичной формы. На головѣ какъ частыя, мелкіе, плотно прилегающіе волоски, на ножкахъ болѣе рѣдкіе. Слабый киль на личномъ щиткѣ. Челюстныя щупальца длинные. Дл. тѣла $4\frac{1}{2}$ —5 mm.