

<i>Groupe et espèces</i>	<i>Fourmis-hôtes</i>	<i>Remarques</i>
<i>A. pubescens</i> Wasm.	<i>Lasius flavus</i>	
<i>A. forell</i> Wasm.	<i>Lasius alienus</i> <i>Lasius niger</i>	

**Famille Laelaptidae****Genre *Laelaps*****SOUS-GENRE *Hypoaspis* BERL.**

<i>L. laevis</i> Mich.	<i>Messor barbara</i> <i>Formica nigricans</i> <i>Formica sanguinea</i>
<i>L. myrmecophilus</i> Berl.	<i>Myrmica scabrinodis</i> <i>Formica rufa</i> <i>Formica rufibarbis</i> <i>Lasius flavus</i>
<i>L. ornatus</i> Berl.	<i>Solenopsis</i> sp.
<i>L. myrmophilus</i> Mich.	<i>Aphaenogaster testaceo-pilosa</i> <i>Myrmica scabrinodis</i> <i>Pheidole pallidula</i> <i>Camponotus aethiops</i> <i>Formica fusca</i> <i>Lasius niger</i>
<i>L. canestrinii</i> Berl.	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>L. acutus</i> Mich.	<i>Camponotus herculeanus</i>
<i>L. elegantulus</i> Berl.	<i>Tapinoma erraticum</i>

**SOUS-GENRE *Androlaelaps* BERL.**

<i>L. karawajewi</i> Berl.	<i>Formica nigricans</i>
----------------------------	--------------------------

**SOUS-GENRE *Laelaspis* (MICH.)**

<i>L. equitans</i> Mich.	<i>Aphaenogaster testaceo-pilosa</i>
<i>L. humeratus</i> Berl.	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>L. finitissimus</i> Berl.	<i>Tapinoma erraticum</i>

**SOUS-GENRE *Oolaelaps* (WASM.)**

<i>L. oophilus</i> Wasm.	<i>Formica nigricans,</i> <i>Formica rufa</i> <i>Formica rufibarbis</i> <i>Formica sanguinea</i>
<i>L. montanus</i> Berl.	<i>Formica fusva</i>
<i>L. parvulus</i> Berl.	<i>Formica fusca</i>

**SOUS-GENRE *Cosmolaelaps* BERL.**

<i>L. cuneifer</i> Mich.	<i>Myrmica scabrinodis</i> <i>Pheidole pallidula</i> <i>Solenopsis fugax</i> (?) <i>Aphaenogaster testaceo-pilosa</i>
--------------------------	--