

<i>Groupe et espèces</i>	<i>Fourmis-hôtes</i>	<i>Remarques</i>
<i>M. laticollis</i> Märk	<i>Lasius fuliginosus</i>	Europe W
<i>M. erratica</i> Hagens	<i>Tapinoma erraticum</i>	Rhénanie, Sicile, France
<i>M. excepta</i> Rey	?	Sud de la France
(<i>Apteranillus</i>) <i>foreli</i> (Wasm.)	<i>Aphaenogaster croceoides</i>	Tunisie. Présence en Europe possible. Afrique Nord
	<i>A. ? testaceo-pilosa</i>	
<i>Astilbus</i> E.		Genres pas spécialement myrmécophiles, mais ressemblant aux Fourmis et les chassant souvent dans leurs nids.
<i>A. canaliculatus</i> F.	<i>Myrmica</i> divers	
<i>A. menmonius</i> Märk	<i>Aphaenogaster</i> divers	
<i>Falagria</i> E. <i>thoracica</i> Curt.	divers <i>Formica</i> , <i>Myrmica</i> et <i>Tetramorium</i> id.	
<i>F. nigra</i> Grav.	<i>Lasius fuliginosus</i>	Europe
<i>Oxyopoda</i> E. <i>vittata</i> Märk	<i>Lasius fuliginosus</i>	France
<i>O. longipes</i> Rey	<i>Lasius niger</i>	
<i>O. formicaticola</i> Märk	<i>Formica rufa</i>	Europe N et centre
<i>O. haemorrhoa</i> Man.	<i>Formica rufa</i> , <i>Formica nigricans</i> , <i>Formica truncicola</i>	Europe N, Sibérie
	<i>Formica exsecta</i>	
<i>O. ? sericea</i> Heer	<i>Formica rufa</i>	Europe N et centre.
		France
<i>O. ? togata</i> Er.	<i>Lasius fuliginosus</i> , <i>Lasius brunneus</i> , <i>Lasius emarginatus</i> , <i>Lasius alienus</i>	Europe, France
<i>O. depressipennis</i> Aubé	?	France S
<i>Athela talpa</i> Heer	<i>Tetramorium</i>	Europe N et centre,
	<i>Formica rufa</i> , <i>Formica nigricans</i> , <i>Formica truncicola</i>	Sibérie
	<i>Formica exsecta</i>	
<i>A. ? myrmecobia</i> Kr.	<i>Formica rufa</i>	Europe Nord et centre
<i>A. ? subterranea</i> Rey	<i>Aphaenogaster</i> cf. <i>subterranea</i>	France Sud
<i>A. ? ebenina</i> Rey	<i>Formica rufa</i>	France
<i>A. ? valida</i> Kr.	<i>Lasius fuliginosus</i>	France
<i>Lamprinus haematopterus</i> Kr.		Rhénanie
<i>L. saginatus</i> Grav.	<i>Tapinoma erraticum</i>	Europe N et centre
	<i>Myrmica laevinodis</i> , <i>Myrmica sulcinodis</i> , <i>Myrmica scabrinodis</i> , <i>Formica rufa</i> ,	
	<i>Lasius</i> divers.	
<i>L. pictus</i> Fairm.	<i>Tapinoma nigerrimum</i>	Oranie, Andalousie
<i>Quedius brevis</i> Er.	<i>Formica rufa</i> ,	Europe N et centre
	<i>Lasius fuliginosus</i>	
<i>Q. microps</i> Grav.	<i>Lasius fuliginosus</i>	<i>id.</i> Creux d'arbres. A chercher en France
		Europe N et centre.
<i>Xantholinus atratus</i> Heer	<i>Formica rufa</i> , <i>Formica nigricans</i>	
(= <i>picipes</i> Thoms)	<i>Lasius fuliginosus</i>	France ? Creux d'arbres
<i>X. ? glaber</i> Nordm.	<i>Lasius fuliginosus</i> , <i>Formica rufa</i>	Europe centrale, Bohème. France. Creux d'arbres.