

Groupe et espèces	Fourmis-hôtes	Remarques
<i>Leptacinus formicetorum</i> Märk	<i>Formica rufa</i> <i>Formica nigricans</i> <i>Formica exsecta</i>	Europe, Sibérie
<i>Stenus aterrimus</i> Er.	<i>Formica rufa</i> <i>Formica nigricans</i>	Europe, Sibérie
<i>Thoracophorus</i> ? <i>corticus</i> Motsch.	<i>Lasius brunneus</i>	France, Allemagne

**Famille Pselaphidae**

(Beaucoup d'espèces, comme les *Bythinus* et les *Euplectus*, ne sont que des myrmécophiles douteux).

<i>Trichonyx salciensis</i> Rchb.	<i>Lasius brunneus</i> , <i>Ponera coarctata</i>	Europe
<i>Amauronyx markeli</i>	<i>Tetramorium caespitum</i> , <i>Myrmica</i> sp. <i>Ponera coarctata</i>	Suisse, Bohême
<i>A. barnevillei</i> Saul.	?	Sud de la France
<i>Trogaster (Heteronyx) ? heterocerus</i> Sauley	?	Corse
? <i>abdrans</i> Sauley	?	Corse
<i>Amaurops ? gallica</i> Delarouzée	<i>Pheidole pallidula</i>	Saint-Raphaël (Var). A chercher
<i>Batrissus formicarius</i> Aubé	<i>Lasius brunneus</i> (rarement <i>Myrmica</i> divers)	Europe W, Angleterre
<i>B. venustus</i> Rchb.	<i>Lasius brunneus</i> (rarement <i>Lasius niger</i> )	Europe centrale et W
<i>B. delaportei</i> Aubé (= <i>schwabi</i> Reitt.)	<i>id.</i>	<i>id.</i>
<i>B. oculatus</i> Aubé	<i>Lasius brunneus</i>	Toute l'Europe
<i>Machaerites folesiae</i> Fauvel	<i>Lasius alienus</i>	Normandie
<i>M. glabratus</i> Rye	<i>Myrmica</i> sp.	Angleterre
<i>Chennium bituberculatum</i> Lat.	<i>Tetramorium caespitum</i>	Europe centre et sud
<i>Centrotoma lucifuga</i> Heyd.	<i>Tetramorium caespitum</i>	Europe centre et sud
<i>C. rubra</i> Sauley	<i>id.</i>	Pyrénées. Prague

**Famille Clavigeridae**

(Famille myrmécophile, surtout d'Amérique et des régions australes).

<i>Claviger</i> Sauley	<i>Lasius</i> jaunes et bruns d'Europe	
<i>C. brücki</i> Sauley	<i>Lasius flavus</i> <i>Lasius carniolicus</i>	Pyrénées-Orientales
<i>O. duvali</i> Sauley	<i>Lasius niger</i>	Sud France