

Famille Phoridae

Les Phoridae attaquent larves, nymphes, et imagos de Fourmis.

Groupe et espèces	Fourmi-hôte	Remarques
<i>Phora formicarum</i> Ver-rall	Nids divers, surtout <i>Lasius niger</i>	Angleterre
<i>Platyphora lubbocki</i> Ver-rall	Nids variés	<i>id.</i>
<i>Apocephalus schmitzi</i> Walk.	<i>Crematogaster scutellaris</i>	
<i>Tubicara lichtwardti</i> Schmitz	<i>Plagiolepis pygmaea</i>	Étudiée par LE MASNE (1941)
<i>Metopina formicamendicula</i> Meig.	<i>Solenopsis</i> sp.	
<i>Aenigmatias</i> (3 esp.)	<i>Formica fusca, rufa.</i>	
<i>Pseudocteon formicarum</i>	<i>Lasius niger</i>	

Famille Scatopsidae

<i>Scatopse leucopeza</i> Meig.	<i>Formica rufa,</i> <i>Lasius brunneus,</i> <i>Lasius fuliginosus.</i>	Hollande, Autriche
---------------------------------	---	--------------------

(Des larves de *Lonchaea*, *Leptocera*, *Phyllomyza*, *Cypsela*, *Milichia*... ont été trouvées dans des fourmilières, mais ce sont des Diptères végétariens ou saprophages, dont la présence ici paraît accidentelle).

Famille Tachinidae

<i>Paragusia elegantula</i> Sm.	<i>Formica cinerea</i>	Parasite des larves.
---------------------------------	------------------------	----------------------