

Formicidae.

Von

H. Stitz, Berlin.

Dorylinae.

1. *Dorylus (Dorylus) affinis* Shuck.

EMERY, Dorylinae (Whytsman, Genera Insect. 1910, S. 9).

1 ♂. Galago-See (Nord-Ruanda).

2. *Dorylus (Anomma) nigricans* Ill. v. *molesta* Gerst.

EMERY, Dorylinae (Whytsman, Genera Insect. 1910, S. 12).

Zahlreiche Neutra, von 13 mm bis 5 mm Länge, bis zum Kopfrand oberhalb der Mandibeln gemessen. — Steppe Süd-Mpororo (NW Deutsch-Ostafrika), August 1907.

3 ♀♀ (med. und min.). — Karissimbi. (NO vom Kiwu-See).

1 ♂. Isalinio (Bambuswald).

Ein zu *D. (A.) nigricans* Ill. gehöriges ♀ (ANDRÉ, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1900. S. 364) im Besitz des Berliner Museums, stammt aus der Ausbeute von GRAUER vom NW-Ufer des Tanganjika-Sees.

3. *Dorylus (Typhlopone) fulvus* Westw. r. *badia* Gerst.

EMERY, Dorylinae (Whytsman, Genera Insect. 1910, S. 13).

1 ♂. Vulkangebiet NO vom Kiwu-See, Oktober 1907.

4. *Dorylus (Rhogmus) fimbriatus* Shuck.

EMERY, Dorylinae (Whytsman, Genera Insect. 1910, S. 14).

1 ♂. SO Mpororo (NW Deutsch-Ostafrika), Juli 1907.

5. *Dorylus (Alaopone) atriceps* Shuck v. *katanensis* n. v.

EMERY, Dorylinae (Whytsman, Genera Insect. 1910, S. 15).

EMERY, Zoolog. Jahrb. (Syst.) 8. 1895, S. 740.

♂. — Fühlerschäfte, wagrecht dem Kopf angelegt, bis zur Mitte der Netzaugen reichend. Diese sowie die Ocellen sind bernsteingelb. Mandibeln geformt