

у настоящих ♀♀ и сильно развитой головой и челюстями. У многих видов ус. очень изменчива и распадается на «подстазы» — крупных, средних и мелких, различающихся не только величиной, но часто и строением тела и окраской.

Современные авторы употребляют четырехзначную номенклатуру для обозначения внутривидовых форм у муравьев, например *Cataglyphis tarsalis*, подвид *aethiops*, var. *concolor* Forel; первые 2 называния обозначают вид, 3е подвид, последнее — вариетет. Ниже даны определения видов и подвидов и вовсе не упоминаются вариететы.

Литература: Рузский, М. Д. Муравьи России. Казань, 1905 — 07. Forel, Les Fourmis de la Suisse. 1920. Forel, A. Die Ameisen der Schweiz. Dübendorf.

1 (6). Стебелек состоит из одного членника.

2 (3). Брюшко с перетяжкой между 1м и 2м членниками (р. 179 Е).

1 подс. Ponerinae (стр. 596)

3 (2). Брюшко без перетяжки.

4 (5). Л. щ. вдается в з. краем между лобными валиками до уровня осн. ус. (р. 179D). Отверстие клоаки — в форме поперечной щели (р. 179A Ea).

3 подс. Dolichoderinae (стр. 600)

5 (4). Л. щ. не вдается между осн. ус. Отверстие клоаки круглое, выдающееся, окруженнное венчиком волосков (р. 179 K).

4 подс. Formicinae (стр. 601)

6 (1). Стебелек состоит из 2 членников. 2 подс. Myrmicinae (стр. 596)

1 подсем. Ponerinae

Примитивные муравьи; ведут подземный образ жизни; живут маленькими гнездами.

1 (2). 2й сегм. бр. очень велик, остальные маленькие, подогнуты под него и направлены вперед в виде небольшого придатка 1. *Syphincta*

2 (1). Бр. длинное, не согнутое. Средние и з. голени с единственной и гребенчатой широпой. 2. *Ponera*

1. **SYPHINCTA** Röd. Исключительно подземные обитатели. Тело короткое, приземистое, конечности толстые. Коричневато-желтый, волосатый ♂ 3—3,8; ♀ 4,5 мм. Средиземноморский вид, найден в Донском окр.

*S. europea rossica* Arribalzaga

2. **PONERA** Latr. Скульптура точечная, не очень густая, на бр. более редкая. Глаза точкообразные, близ передних углов головы. Темный или коричневый с желтыми ус., жвалами и, отчасти, ногами (р. 179 E). ♂ 2,7—3,2; ♀ 3,5—4 мм. Украина, Крым.

*P. coarctata* Latr.

2 подсем. Myrmicinae

1 (2). 2й чл. стебелька широкий, почти полушаровидный, всем своим широким концом соединяется с 1м чл. брюшка (р. 179P). Л. щ. спереди глубоко выемчатый. 8. *Anergates*.

2 (1). Стебелек иного строения.

3 (4). Чел. без зубчиков, узкие, цилиндрические, заостренные. Гол. сзади с выемкой (р. 179Aa, Ba). 5. *Strongylognathus*.

4 (3). Чел. широкие, плоские.

5 (6). Бул. ус. очень велика, 2чл., резко ограничена от остальных чл. (р. 179U). ♀♀ желтые, не больше 3 мм. 3. *Solenopsis*.

6 (5). Бул. ус. или плохо выражена или из большего числа членников.

7 (8). 1й чл. стеб. не стебельчатый — без п. узкой цилиндрической части, почти кубический, сверху квадратный (р. 179Ca). 6. *Myrmecia*.