

8 (7). 1й членник стебелька другой формы.

9 (14). 2й чл. стеб. снизу с зубцом (как и 1й) (р. 179G).

10 (13). Жевательный край жвал со многими зубчиками.

11 (12). Ус. 12членниковые. Только ♀ и ♂, похожие на *Myrmica*.

13. *Symbiomyrmex*.

12 (11). Ус. 11членниковые (♀, ♂). Гладкий, сильно блестящий.

7. *Formicoxenus*.

13 (10). Жевательный край жвал ровный, без зубчиков. Ус. 11членниковые.

9. *Nargagoxenus*.

14 (9). 2й чл. стебелька снизу без крупного зубца.

15 (16). Кроме ♀ имеются и 2♂ (солдаты) с оч. большой, широкой головой. Булава ус. 3чл., длиннее остальной части жгутика.

14. *Pheidole*.

16 (15). Солдат нет. Булава если выражена, не длиннее остальной части жгутика.

17 (18). Край л. щ., окаймляющий усиковые ямки между лобными валиками и основанием жвал острый и приподнятый в виде киля. П. углы исп. выступают в виде тупых углов при рассматривании сверху и сзади.

4. *Tetramorium*.

18 (17). Край л. щ. окаймляющий усиковые ямки, плоский, не образует острого валика.

19 (22). 3 последние чл. жгутика ус. образуют ясную булаву, равную по длине остальной части жгутика (р. 179 Y).

20 (21). Без относящих волосков на теле. 2й чл. стеб. широкий, овальный или сердцевидный, вдвое шире 1го (р. 179 N,O).

11. *Cardiocondyla*.

21 (20). Тело с отстоящими вол. 2й чл. стеб. лишь немного шире 1го. Цвет желтый, реже темный (р. 179 H, Fa, Ga). 10. *Leptothorax*.

22 (19). 3 последние чл. жгутика ус. вместе короче остальной части жгутика и не образуют ясной булавы.

23 (24). Шпора на з. голени гребенчатая. Цилиндрическая часть (стебелек) 1го членика стебелька спереди и снизу с зубцом (р. 179J). Красный или красно-коричневый.

12. *Myrmica*.

24 (23). Шпора на з. голени, если присутствует, простая, не гребенчатая. Цилиндрическая часть 1го чл. стебелька без зубца.

25 (26). Л. щ. с 2 прод. килевидными возвышениями. Зсп. с 2 шипиками (р. 179 A).

15. *Stenamma*.

26 (25). Л. щ. без килей. Зсп. почти ровная или с 2 бугорками. Чел. широкие и короткие с выпуклым наружным краем (р. 179T). 16. *Messor*.

3. **SOLENOPSIS** Westw. ♀ маленькие, 1,5—2,5 мм, желтого цвета с точкообразными глазами; ♀ 5—6 мм, темно-бурые. Живет многочисленными гнездами в земле, обычно рядом с гнездами других муравьев, у которых похищает и поедает молодь. Степи. *S. fugax* Latr.

4. **TETRAMORIUM** Maug. Голова мало блестящая, грубо прод. морщинистая. Крайне варьируют в скульптуре, величине и окраске (от буро-желтого до черного, чаще темнокоричневые). ♀ 2,3—3,2 мм. ♀ не больше 5,5; ♀ и ♂ черные. Широко распространены. *T. caespitum* L.

5. **STRONGYLOGNATHUS** Maug. Живут совместно с *Tetramorium caespitum*. 1 (?) Голова сзади с глубокой и широкой вырезкой и сильно