

выдающимися назад и вниз в углах (р. 179 Аа). Блестящий, желтый 2,3—3; ♀ 4 мм, темнокоричневая. Украина, Крым.

*St. testaceus* Schenk.

2 (1). Гол. лишь слабо выемчата с округлым в. углами (р. 179Ва). Коричнево-желтый с темным верхом головы стебелька и бр. ♂ 3—3,2; ♀ 4—4,5 мм. Украина, Поволжье, Крым.

*St. huberi* L.

6. **MYRMECINA** Curtis. Тело плотное, черно-коричневое; ус. и ноги желтые. ♀ 2,5—3,1 мм; ♀ и ♂ мелкие, 3,4—3,7 мм, с дымчатыми крыльями. В тенистых сырых лесах, маленькими гнездами; при дотрагивании притворяется мертвым. Украина, Крым (р. 179 Са).

*M. graminicola* Latr.

7. **FORMICOXENUS** Maug. Гладкий, сильно блестящий, желто-коричневый. ♀ 2,5—3,2 мм; бескрылая (эргатоидная) ♀ (р. 179G) 3—3,3 мм, глазками, более темного цвета; крылатая ♀ 3—3,8 мм темнокоричневая; ♂ эргатоидный, 2,5—3 мм отличается от ♀ присутствием глазков и беззубыми жвалами. В гнездах *Formica rufa* и *F. pratensis*. Лесная полоса, Крым, Украина.

*F. nitidulus* Nylander

8. **ANERGATES** For. Рабочие отсутствуют. ♂ ок. 3 мм бледножелтый с крупным брюшком, подогнутым под грудь, бескрылый; ♀ черная с коричневым раздутым бр. (р. 179P); 2,5—3 мм. В муравейниках *Tetramorium caespitum*. Украина, З. Сибирь.

*A. atratulus* Schenck.

9. **NARPAGOXENUS** For. (*Tomognathus* Maug.). ♀ 3,4—5 мм; желто-коричневый; гол. морщинистая, слабо блестящая, бр. сильно блестящая, гладкое; ♀ 4,1—5 мм: эргатоидная, имеет 1 глазок, крылатая—3. В гнездах *Leptothorax acervorum*, редок. Лесная полоса.

*N. sublaevis* Nylander

10. **LEPTOTHORAX** Maug. 1 (4). Ус. у ♂ и ♀ 11 чл., ♂ — 12 члениковыми. (Подрод *Mychothorax* Ruzsky).

2 (3). Ноги с отстоящими вол. Коричневато-красный с темным верхом головы и бр., ♂ и ♀ 3—4,2 мм. Кроме юга, в лесах.

*L. acervorum* F.

3 (2). Ноги без отстоящих вол. ♀ 2,5—3,2; ♀ 2,5—3,8. Распр. как пред.

*L. muscorum* Nylander

4 (1). Ус. у ♂ и ♀ 12 чл., ♂ — 13 чл. (Подрод *Leptothorax* Maug.).

5 (6). Перетяжка между срсп. и зсп. имеется. Шипы на зсп. длинные и острые. Желтый с коричневым верхом головы и темнокоричневой полосой на 1м чл. бр. Лиственные леса Украины ♀ 2—3 мм.

*L. nylanderi* Foerster

6 (5). Профиль спины ровный, без углубления, вследствие отсутствия перетяжки между срсп. и зсп. (р. 179 Fa).

7 (8). Шипы на зсп. длинные, изогнутые, равные основной пов. ее (р. 179H). Желто-красный с черно-коричнев. бр. ♂ 2,2—3,6 мм. Степи.

*L. nassonowi* Ruzsky.

8 (7). Шипы более короткие, широкие при основании и прямые или лишь с едва согнутым концом или очень короткие, зубцеобразные.

9 (10). Шипы имеют вид маленьких зубчиков; 1й чл. стебелька без передней цилиндрической части, очень короткий. Верх головы и бр.