

темно-коричневые, остальное красноватое. ♂ 2,5—3,2; ♀ 3,8—3,8 мм. Под корой. Украина.

*L. corticalis* Schenck.

10 (9). Шипы много длиннее; 1 чл. стебелька с короткой цилиндрической частью. Булава ус. темнокоричневая.

11 (12). Верх головы, как и все тело желтые, на 1 м чл. бр. темнокоричневая полоса. ♂ 2,5—3,2 мм; ♀ 4—4,5 мм. Ю. степи.

*L. tuberum unifasciatum* Latr.

12 (11). Верх головы коричневый. Грудь сверху нежно морщинистая без точек. Бр. темнокоричневое, при осн. бр. желтое пятно. ♂ 2—3, ♀ 2—4,5 мм. темнокоричневая. Гнездится под корой, в пнях и корнях. Всюду, кроме Севера.

*L. tuberum* F.

11. **CARDIOCONDYLA** Em. Самцы красно-желтые, эргатоидные, не больше 20 в гнезде. 1 (2). Узелок 2го членика стебелька сверху сердцевидный (р. 179-0); голова покрыта круглыми, поверхностными ямками, несущими каждая по прилегающему короткому вол. Без морщинок. ♂ 2—2,3, ♀ 3—3,3 мм, 2й чл. стеб. почти вдвое шире 1го. Пески Харьковского окр.

*C. elegans schkaffi* Arn.

2 (1). Узелок 2го чл. стеб. поперечно овальный (р. 179 N), гол. и грудь покрыты частыми и мелкими прод. морщинками с ямками в промежутках. Черный дов. блестящий, ноги, ус. и жвалы желтые. ♂ 2,3—3 мм. Приморские пески и солончаки Крыма, Кубани, Дона.

*C. stambulovi taurica* Karav.

12. **MYRMICA** Latr. 1 (4). Рукоять ус. на осн. равномерно и постепенно согнута, так что основание и конец ее образуют очень тупой угол (р. 179 V), на месте сгиба она тоньше, чем в середине своей длины. Булава ус. 4 член. Коричневато-красный (р. 179 J).

2 (3). Эсп. между шипами поперечно морщинистая; узелоч. 2го чл. стеб. гладкий; шипы короткие, меньше основной пов. эсп. ♂ 4—5, ♀ 6,3—7 мм.

*M. rubra laevinodis* Nyl.

3 (2). Эсп. между шипами поперечно-морщинистая; узелок 2го член. стеб. неровный, продольно бороздчатый; шипы равны основной пов. эсп. Размеры немного больше.

*M. rubra ruginodis* Nyl.

4 (1). Рукоять ус. на осн. быстро и круто согнута, образуя прямой или почти прямой угол, если согнута более слабо, то место сгиба не тоньше середины рукояти (р. 179 W, X). Бул. ус. 3 член.

5 (10). Рукоять ус. коленообразно согнута, образуя прямой угол и на месте сгиба имеет зубец или лопасть.

6 (7). Рукоять ус. на сгибе с маленьким зубцеобразным придатком или с широкой лопастью, постановленной косо к ее прод. оси (р. 179 W). Шипы длиннее основной пов. эсп.; коричневато-желтокрасный; ♂ 3,5—5; ♀ 5,5—6,5 мм. Почти повсюду.

*M. scabrinodis* Nyl.

7 (6). Рукоять ус. с широкой лопастью, направленной поперек. прод. ее оси (р. 179 X).

8 (9). Шипы эсп. короче ее осн. пов. Ширина лба между л. в. равна  $\frac{1}{4}$ , наибольшей шир. гол.; с с длиной рукоятю ус. Темно красно-коричневый, гол. и бр. черно-коричневые. ♂ 4,5—5,5; ♀ 5—6 мм.

*M. lobicornis* Nyl.

9 (8). Шипы эсп. длиннее осн. пов. эсп., слегка изогнутые. Шир. лба