

равна $\frac{1}{4}$ ширины гол.; рукоять ус. ♂ не больше 3—4 следующих вместе. Окраска и величина как пред. M. schenkei

10 (5). Рукоять ус. на ровном сгибе зубца или лопасти.

11 (12). Лобная площадка гладкая, блестящая, иногда со штрихованостью в верх. части. Узелки стебелька тонко морщинисты. Красновато-желтые с коричневой гол. и бр. ♀ 3,5—4,5; ♀ 5,5—6,5 мм. Широко распространены. M. rugulosa N.

12 (11). Лобная площадка грубо прод. штрихованая; узелки стеб. горизонтальные. Темно-коричневато-красный, с черноватым бр. и верхом головы. ♀ 4,8—6; ♀ 6,5—7 мм. Вид горный. M. sulcinodis N.

13. SYMBIOMYRMA Arn. Рабочих нет, живут в недрах *Mugim scabrinodis*. ♀ красновато-коричнев., 4 мм. ♂ коричневый, 3,8 мм. Харьковск. округ. S. kagaujaevi Arn.

14. PHEIDOLE Westw. гол. маленькая с выпуклыми боками, рукоять ус. длинная; 1,8—2,7 мм. Солдат (2): гол. очень большая, квадратная, глубокой выемкой на затылке, ус. короткие, 3,7—4,2 мм; желты. ♀ черно-коричневая, 6—8,5 мм. Степи Предкавказья и Крым? Ph. pallidula adenocarpi Koz.

15. STENAMMA Westw. Живут в сырых тенистых лесах маленькими гнездятся подо мхом и гниющей листвой. Темнокоричневый; морщинистость гол. и груди неправильная — гл. обр. сетчатая. Украина.

1 (2). Голова почти прямоугольная, со слабо закругленными боками. Грудь сверху с морщинками и ямками. Сильно блестящий. ♀ 3,5—4; ♂ 5,5 мм (р. 179 A). St. uscainicum Arn.

2 (1). Голова с сильно закруженными боками. Грудь без ямок. ♂ 5,5 мм. St. golosejevi Karav.

16. MESSOR For. Зерноядны; роют глубокие норы в земле обычно кратерообразным входом. Голова покрыта частыми прод. морщинками, матовая, только затылочный край и 2. углы б. м. блестящие. Рукоять ус. на осн. с маленькой лопастью. Цвет изменчив, от желтовато-коричневого до коричнево-черного. ♀ 3,5—9,5; ♀ 9—15 мм. Степи, Крым. M. structor Linn.

3 подсем. Dolichoderinae

1 (2). Зсп. с 2 зубцами; спр. и зсп. глубокое вдавление; покатая поверхность зсп. вогнутая (р. 179 Da). 17. Dolichoderus.

2 (1). Зсп. без зубчиков; ее покатая поверхность не вогнутая.

3 (4). Л.щ. с вырезкой посреди п. края (р. 179D). 18. Tapinoma.

4 (3). Л.щ. без вырезки.

5 (6). Бр. выдается вперед и прикрывает маленькую наклонную чешуйку. Без глазков. Не больше 3 мм (р. 179 Ea). 20. Bothriomyrmex

6 (5). Бр. не прикрывает чешуйку. Глазки имеются; размеры большие. 19. Liometopum.

17. DOLICHODERUS Lund. Гол. и бр. черные, грудь красная; на бр. 4 (или 2) желтоватых пятна. ♀ 3—4; ♀ 4,6—5,2 мм. Гнездится в деревьях, Крым (р. 179 Da). D. quadripunctatus L.