

- 5 (4). Вырезки на л. щитке нет; тело матовое.
- 6 (9). Все тело, а также и конечности черного цвета.
- 7 (8). Вол. золотистого цвета; редкие отстоящие вол. на брюшке расположены каймой по п. и з. краю сегментов. ♂ 6—13, ♀ 15,5—17. Поволжье, Урал; гнезда в земле. *C. herculeanus saxatilis* Ruzt.
- 8 (7). Вол. пепельного цвета; отстоящие вол. на бр. более частые, разбросанно лежащие. ♀ до 12, ♀—17 мм. Центр до лесостепи, Юг; гнездится в дереве. *C. vagus* Scop.
- 9 (6). Грудь, чешуйка и ноги темнокрасного цвета. ♀ 6—14, ♀ 15—18 мм, живет в дереве, вытачивая большие гнезда. «Красно-грудой дровоточец».
- 10 (11). Бр. матовое, сплошь черное или с маленьким красноватым пятном на осн. Цвет тела темно- или коричнево-красный. Лесная полоса.
- C. herculeanus herculeanus* L.
- 11 (10). Бр. дов. блестящие, п.  $\frac{1}{2}$ , 1го сегм. красная. Красный цвет более яркий. Юг лесной полосы. *C. herculeanus lighiperdus* Latr.
- 12 (3). Жвалы с 6—7 зубчиками. Л. щ. выдается вперед в виде приспособленной лопасти, с боков слегка выемчатой. С редкими отстоящими волосками, щеки волосятые. Черный, блестящий, ноги иногда красноватые. ♀ 5—10, ♀ 12—15 мм. Гнездится в земле. Юг (р. 179 G). *C. aethiops* Latr.
- 13 (2). Между спр. и зсп. глубокое углубление; покатая поверхность зсп. вертикальна и образует с основной пов. резкий угол. Весь черного цвета; ♂ 3—7, ♀ 8—11 мм. Гнездится в земле. Степи. *C. piceus* Leach.
- 14 (1). У ♀ гол. короткая, вздута и притуплена, у солдат (4) — срезана юсти под прямым углом ко лбу и л.щ. с параллельными краями. Красно-коричневый, бр. темное. ♂ 3—5; ♀ 5—6; ♀ 6—8 мм. Устраивает большие гнезда в дереве. Крым.
- C. (Colobopsis) truncatus* Spin.
22. PRENOLEPIS Maug. Рукоять ус. достигает до срса, короче жгутика. Коричневый блестящий. ♂ 3—4 мм. Крым (р. 179 E, K). *Pr. nitens* Maug.
23. LASLUS Fabr. (*Acanthomyops* Maug., *Formicina* Shuck.).
- 1 (2). Сильно блестящий, смоляно-черного цвета. Голова сердцевидная с сильной выемкой на з. крае. ♂ 4—5; ♀ 7—8 мм. Гнездится в дереве. Центр, юг. *L. fuliginosus* Latr.
- 2 (1). Матовый или слабо блестящий, с частым прилегающим опушением.
- 3 (10). Тело равномерно светло- или черно-коричневое, или голова и бр. коричневые, грудь желто-красная. Челюстные щупики длинные, почти достигают (снизу) затылочного отверстия, или, по крайней мере,  $\frac{1}{2}$ , расстояния от их осн. до затыл. отверстия.
- 4 (7). Рукоять усиков и голени с отстоящими волосками.
- 5 (6). Все тело бурое или буро-черное, только грудь иногда чуть светлее. ♂ 3—4,5, ♀ 7,5—10 мм. Всюду. *L. niger niger* L.
- 6 (5). Гол. и бр. коричневые, грудь красно-желтая. Величина как предыдущ. Украина, Крым; в лиственных лесах. *L. emarginatus* Ob.
- 7 (4). Рукоять усиков и голени без отстоящих волосков.
- 8 (9). Похож на *L. niger niger*, но тело светло-коричневое, с более низким