

- 8 (13). Голова красная с черным, или вся красная. ♂ 5—9, 11 мм.
- 9 (10). Голова и грудь красная, лишь очень редко с темными пятнами. $\frac{1}{3}$ 1го бр. сегм. красная. С частыми короткими желтыми отстоящими вол. на теле, ус. и голенях. Цвет тела яркий.
- F. rufa tigrisoma* Fbr. (*tigricola*)
- 10 (9). Гол. и иногда шир. с темным пятном.
- 11 (12). Тело и голени с дов. чистыми и длинными серыми отстоящими вол. Большое темнобурое пятно на псп.; без красного пятна на 1го бр. сегмента.
- F. rufa pratensis*
- 12 (11). Тело как и голени и ус. почти без отстающих вол. без вол. С красным пятном при осн. бр. Повсюду в лесной пол. на юге.
- F. rufa grisescens*
- 13 (8). Гол. совершенно черная; лобная площадка матовая. ♂ 8,5—10 мм. На Урале и в Сибири — степь и лесостепь; центр. Европы.
- F. uralensis* Bz.
- 14 (7). Грудь не высокая удлиненная с дов. плоской осн. пок. (р. 179М). Длина головы заметно больше ширины, 3—4й чл. жгутиков лишь немногого длиннее 6—8го. Тело и лобная площадка матовые исключением *F. gagates* и *F. picea*, все тело которых блестящее).
- 15 (16). На ниж. стороне головы — длинные вол.-щетинки; все тело частными и отстоящими и прилегающими вол., придающими ему шелковистый сероватый оттенок. Темнокоричневый или с красной головой грудью (var. *imitans* Ruzsky). ♂ 4,7—6, ♀ 9—11 мм. На песках.
- F. cinerea* M.
- 16 (15). На нижней стороне головы нет отстоящих вол.-щетинок, не имеет шелковистого оттенка.
- 17 (20). Почти все тело блестящее, включая и лобную площадку. Блескость крайне слабая. Черный или буро-черный, конечности бурые.
- 18 (19). Зсп. в профиль округленная. ♂ 5—7,5; ♀ 9—10 мм. Ю. степи Украины и Крыма.
- F. gagates* L.
- 19 (18). Зсп. в профиль угловатая. До 6,5 мм (♂). Торфяники в южной полосе.
- F. picea* N.
- 20 (17). Тело довольно матовое; лобная площадка матовая.
- 21 (22). Тело одноцветное, темнокоричневое или корични-черное, конечности красноватые. Отстоящие вол. редкие. В лесах. ♂ 4—7; ♀ 9—10 мм.
- F. fusca* Bz.
- 22 (21). Грудь, голова, чешуйка и ножки желтовато-красного или коричневатого цвета, бр. верх, головы и обычно пятно на псп. черновато-коричневые. ♂ 4, 5—6,5; 9—10 мм. Всюду.
- F. rufibarbis* Fbr.
25. **PROFORMICA** Ruzsky. Черный с коричнево-желтыми конечностями, слабо блестящий; бр. сильно блестящее, обычно с легким медным отливом. Диморфизм очень резкий: ♂ малый — 2,5—3, ♂ большой — 4,5—5,5, ♀ 6—7 мм. Ю. степи, Крым.
- Pr. nasuta Ny.
26. **ROSSOMYRMEX** Arnoldi. 44: Рыжевато-красный, бр. черное; зеркально-блестящий, бока груди слабо морщинисты. С очень длинными щетинистыми волосками. Глазки есть, 5,2—5,6 мм. Степи ю.-востока. Живет в земляных норах вместе с *Proformica nasuta*, которую держат в качестве «рабов».
- R. proformicagrum* Ap.