

- нут почти под прямым углом. Гнезда в виде небольших холмиков из листьев и мелких кусочков травы . . . . . *Coptiformica* Müll.
- Затылочный край головы без выемки. Передний край скутума самки плавлю округлен . . . . . 3
3. Тело одноцветное, черное или коричневатое, лобная площадка матовая и не отличается от остальной поверхности головы, глаза без волосков. Гнезда в древесине или почве без наружных построек из растительных остатков . . . . . *Serviformica* For.
- Тело двухцветное, голова и грудь частично или сплошь красные, брюшко бурое, лобная площадка более блестящая, чем остальная поверхность головы, глаза самцов с отстоящими волосками. Гнезда с высокими наружными постройками из растительных частиц . . . . . *Formica* (s. str.) L.

## ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ

### Подрод *Raptiformica* Forel, 1913

#### Рабочие

1. Голова буровато-красная, лоб, темя и затылок несколько темнее. Грудь и ноги ржаво-красные, брюшко бурое, иногда с буровато-красным пятном на наклонной поверхности 1-го тергита. На голове и груди короткие и редкие отстоящие волоски, на всех тергитах и стернитах брюшка — более длинные и густые . . . . . *F. (R.) sanguinea* Latr.

#### Самки

1. Почти вся голова, грудь и ноги буровато-красные, верхняя часть головы и брюшко темно-бурое. Грудь уже головы (смотреть сверху). На всем теле — короткие и редкие отстоящие волоски. Крылья в передней части темные . . . . . *F. (R.) sanguinea* Latr.

#### Самцы

1. Голова, грудь и брюшко черные, усики, жвалы и ноги темно-коричневые. Жвалы с 3—4 широкими зубцами на жевательном крае, глаза без волосков. Короткие отстоящие волоски — на лбу, около глазков, на наличнике и всех сегментах груди, единичные наклонные — на всех тергитах брюшка (особенно заметные на 3 последних), более длинные — на всех стернитах. Чешуйка сплошь покрыта длинными наклонными волосками . . . . . *F. (R.) sanguinea* Latr.

### Подрод *Serviformica* Forel, 1913

#### Рабочие

1. Двухцветные, красные с бурым до черного . . . . . 2
- Одноцветные, черные или коричневатые-черные . . . . . 3
2. Голова и брюшко целиком черные, грудь буровато-красная с темными пятнами. На теле редкие отстоящие волоски, телосложение плотное. Гнезда с куполами из растительных частиц . . . . . *F. (S.) uralensis* Ruzs.
- Голова и грудь красные с бурыми пятнами на затылке и переднеспинке, брюшко бурое. На груди (особенно на переднеспинке) многочисленные отстоящие волоски. Посередине затылочного края головы и на верхней стороне чешуйки — редкие отстоящие волоски. Гнезда в почве . . . . . *F. (S.) subpilosa* ruzskyi Dluss.
3. Тело гладкое и блестящее, брюшко с очень редким прилежащим опушением, одинаковым на всех тергитах. На наличнике, на лбу, около глазков, на нижней стороне головы, переднеспинке, среднеспинке и всей поверхности брюшка хорошо заметные отстоящие волоски . . . . . *F. (S.) picea* Nyl.
- Прилежащее опушение брюшка неодинаковое: на 1-м тергите несколько гуще и длиннее (длина волосков больше расстояния между ними), на 2-м и 3-м — редкое и короткое (длина волосков равна расстоянию между ними). Редкие отстоящие волоски на наличнике, лбу, около глазков, иногда на нижней стороне головы . . . . . *F. (S.) gagatoides* Ruzs.
4. Все тело черное, совершенно матовое, тонко и густо скульптурированное. На груди и на средних бедрах, как правило, нет отстоящих волосков (если есть, то не более 2). Гнезда в почвенных холмиках . . . . . *F. (S.) japonica* Motsch.
- Тело со слабым блеском на боках и нижней стороне головы и груди . . . . . 5
5. На переднеспинке группа из 4—6 пар коротких наклонных волосков, средние бедра с рядом из 3—4 волосков на внутреннем крае (рис. 4, 6, 7) . . . . . *F. (S.) lemani* Bondr.
- Переднеспинка и средние бедра с 1—2 короткими отстоящими волосками или без них (рис. 5, 8) . . . . . *F. (S.) fusca* L.

#### Самки

1. Двухцветные: красные с бурым до черного. Брюшко матовое с густыми прилежащими волосками . . . . . 2