

Formica (Coptoformica) longiceps Dlussky, 1964

Распространение. Южные районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, Монголия.

Материал. 500 рабочих, 2 самки, 6 самцов из Приморья, южных районов Хабаровского края и Амурской области. На Дальнем Востоке отмечен впервые.

Экология. Отмечен на Суйфуно-Ханкайской и Зейско-Буреинской равнинах и в нижнем течении Амура. Обитает на открытых полянах, поросших густой травой. Гнезда обычно располагаются группами (до 50). Представляют собой невысокие холмики округлой формы (d—50 см, h—30 см) из кусочков травы и сухих листьев. Населенные гнезда не более 3000 особей. Муравьи охотятся на разных насекомых, в том числе на довольно крупных, охотно посещают колонии тлей. Крылатые самцы и самки в гнездах в конце августа.

Formica (Coptoformica) rufomaculata Ruzsky, 1895¹

Распространение. Южные районы европейской части СССР и Дальнего Востока.

Материал. Приморский край: пос. Анисимовка, гора Криничная, 29.VII 1974, 16 рабочих, 15—18.VII 1975, 13 рабочих, 2 самки; пос. Тигровой, 3.VI 1975, 30 рабочих, 1 самка (Купянская), 10.VII 1975, 3 рабочих, 2 самки (Омелько); Уссурийский заповедник, 31.V 1969, 11 рабочих; верховья р. Большая Уссурка, 7.VIII 1971, 50 рабочих, 5 самцов; 25 км севернее пос. Молчановка, 28.VI 1973, 40 рабочих, 1 самка, 1 самец (Купянская).

Указан Длусским [1967] с юга Приморского края по рабочим особям, собранным Кузнецовым-Угамским. Рабочие дальневосточной серии, в противоположность европейским, окрашены несложно ярче, остальные характерные признаки такие же: 1 хета на наличнике, отстоящие волоски на брюшке, начиная с 3-го тергита, укороченный скапус, относительно широкая голова и заостренная чешуйка (рис. 16—25).

Размеры частей тела муравьев *F. (C.) rufomaculata* (мм)

Стаза	Кол-во экз.	Длина груди	Длина головы	Отношение длины головы к ширине	Отношение длины скапуса к ширине головы
Рабочий	30	1,94	1,43	1,10	1,02
Самка	5	2,20	1,46	1,17	0,89
Самец	5	2,45	1,06	0,91	0,90

Самка (описывается впервые). Длина тела 4,5—5 мм. Двухцветная: верх головы, груди и чешуйки, а также брюшко темно-коричневые, остальная часть коричневато-желтая. Голова и грудь гладкие и блестящие, брюшко менее блестящее, шелковистое. Голова относительно широкая (ширина меньше длины только в 1,08—1,12 раза), скапус укороченный (в 0,98—1,5 раза длиннее ширины головы). Чешуйки слегка расширенные в верхней части, вырезка на верхнем крае глубокая, ее внутренние стороны ровные. Отстоящие волоски только на переднем крае наличника (1 длинная хета), на задних краях тергитов (на-

¹ Возможно, окажется новым видом после нахождения самцов и самок из типовой местности.