

МУРАВЬИ (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

*A. N. Купянская*

*Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток*

Большие различия в природных условиях северных и южных районов Дальнего Востока СССР дали нам основание для территориально-го расчленения региона на две неравные части: северную и южную [Гвоздецкий, Михайлов, 1978]. Если на юге Дальнего Востока проводились какие-то исследования по фауне муравьев [Рузский, 1925; Кузнецов-Угамский, 1928; Купянская, 1979а, 1979б, 1980], то северные районы в этом отношении исследованы слабо. Небольшой материал по муравьям Камчатки собран зоологической экспедицией Рябушинского (1908—1909 гг.) и обработан М. Д. Рузским [1920]. М. Д. Рузский приводит список, содержащий 16 форм (11 видов, в современном понимании) с Камчатки и 1 форму (*Camponotus herculeanus saxatilis* Ruzs.) с Охотского побережья (Аян, Нелькан). В последнее время появилось несколько статей по фауне и экологии муравьев Магаданской области [Берман и др., 1979, 1980; Жигульская, Берман, 1976; Жигульская, 1979].

В нашей работе приводятся результаты исследований (1960—1963, 1976, 1982 гг.) в Хабаровском крае (Охотск, Арка, Аян, Нелькан), Магаданской области (Магадан, Палатка, Мадаун), в Корякском автономном округе (Корф, Тиличики, Каменское, Аянка), на п-ове Камчатка (Паужетка, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Мильково, Пущино, Щапино, Долиновка, Крапивная, Козыревск, Ключи, Эссо, Озерновский, Усть-Большерецк, Усть-Камчатск), о-ве Парамушир (Северо-Курильск, вулкан Эбеко). Рассматриваются видовой состав, распространение, стациональное распределение и особенности гнездования муравьев в северных районах Дальнего Востока. В работе использованы коллекции Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР (Владивосток), Зоологического института АН СССР (Ленинград) и Зоологического музея Московского государственного университета. Собрано и просмотрено в общей сложности около 20 тыс. насекомых.

В северной части Дальнего Востока преобладает горный рельеф: на северо-востоке расположены средневысотные хребты и низкогорные массивы Чукотского и Корякского нагорьев и Анадырского плоскогорья, на Охотском побережье — хр. Джугджура, на Камчатке — хребты Срединный и Восточный. Равнины имеют подчиненное значение и приурочены к западному и восточному побережьям Охотского моря (Западно-Камчатская низменность и Кава-Тауйская равнина), долинам рек и межгорным понижениям (Пенжинская и Ана-