

35. *F. (Serviformica) rufibarbis* ssp. *subpilosa* Ruzsky. — ♂♂ di Harbin (Manciuria Centrale).
 36. *Lasius niger* L. — ♂♂ di Tsingtau.
 37. *L. niger* ssp. *aliena* Foerst. — ♂♂ di Harbin.
 38. *L. brunneus* Latr. ♂♂ di Shanghai.
 39. *L. umbratus* var. *affinis* Schenck. Una ♀ di Dairen.

Asia paleartica.

1. *Myrmica eidmanni* n. sp. (Abb. 3).

Operaia. — Nera; torace e pedicelo picei, appendici un poco più chiare. Scultura assai forte soprattutto nel capo, costituita da alte rughe più o meno anastomizzate eccetto che nei fianchi del torace;




Abb. 3. *Myrmica eidmanni* n. sp.
 A pedicelo visto di profilo; B scapo; C capo.

gastro liscio. Peli dritti numerosi, di colore biancastro e più lunghi nel corpo che nelle appendici; quelli degli articoli del funicolo sono così lunghi quanto gli articoli stessi, salvo naturalmente quelli degli articoli della clava. — Capo ovale, leggermente più ristretto all'indietro che davanti, coi lati moderatamente convessi. Mandibole opache e striate. Cliepo col margine anteriore leggermente arrotondato nel mezzo,