

HYMENOPTERA

FORMICIDAE

CARLO MENOZZI

Il materiale mirmecologico raccolto durante la Missione del prof. E. ZAVATTARI nel Paese dei Borana, comprende 35 forme di formiche, tra specie, subspecie e varietà, due delle quali vengono descritte come nuove, mentre di alcune altre si descrivono in parte gli individui sessuati non ancora noti. È da notare che la regione ove è stata fatta la raccolta è una di quelle, fra le tante altre dell'Etiopia, che dal punto di vista mirmecofaunistico sono completamente sconosciute, e che pertanto tutto il materiale in questione rappresenta una novità. D'altra parte è da augurarsi che esso segni l'inizio di ulteriori e più vaste ricerche in tutto il territorio dell'A. O. I. di questi insetti, e che queste ricerche siano condotte non dal solo punto di vista faunistico, ma abbiano specialmente presente il rilevamento di tutte quelle particolarità biologiche che indicano i rapporti che questi imenotteri hanno, direttamente o indirettamente, con le piante, gli animali e con l'uomo stesso e che li rendono perciò così altamente interessanti sia dal lato scientifico che da quello pratico.

DORYLINAE

Gen. DORYLUS Fabr.

Dorylus (Typhlopone) fulvus ssp. *euroa* Em.

EMERY, 1915, « Boll. Lab. Zool. gen. agr. », Portici, pag. 5.

Javello, 18 aprile 1937: 1 ♂.