

*Gen. EUPONERA* Forel.

*Euponera (Brachyponera) sennaarensis* Mayr.

EMERY, 1911, *Gen. Insect. Ponerinae*, pag. 84.

Malca Guba, 18 marzo 1937: 1 ♀, numerose ♂.

*Gen. PLECTROCTENA* F. Smith.

*Plectroctena mandibularis* F. Sm.

SANTSCHI, 1924, « *Rev. Suisse Zoolog.* », pag. 173.

Neghelli, 4 giugno 1937: alcune ♀.

*Gen. LEPTOGENYS (Roger) Forel.*

*Leptogenys (s. str.) pavesii* Em.

EMERY, 1911, *Gen. Insect. Ponerinae*, pag. 99.

Neghelli: 14 marzo 1937: alcune ♀.

Specie originariamente descritta di Obbia (Somalia italiana) e poi trovata nell'Africa Orientale Inglese e nel Tanganica.

MYRMICINAE

*Gen. SIMA* Roger.

*Sima (Tetraponera) zavattarii* sp. n.

Fig. 1; 3, 4.

*Operaia*. Nera, colle mandibole, le antenne (salvo la metà distale del funicolo slayato di bruno), lobi frontali, articolazione delle zampe, trocanteri e tarsi di colore testaceo o rosso mattone; coscia, femori e tibie picci. Capo e torace opachi, forniti di una scultura formata da un reticolo ben visibile e cosparso di punti, i quali sono assai più numerosi nel capo. Pedicolo e gastro lucidi, con una scultura reticolare