

\*La femmina del *C. mimosae* (non prima nota), presenta la colorazione analoga a quella dell'operaia. Le strie del capo sono più marcate, longitudinali, eccetto alcune che dal disopra delle lamine frontali convergono verso l'ocello impari. Il torace è tutto regolarmente striato salvo una linea mediana nella metà anteriore del mesonoto e nella parte posteriore dello scutello, che è liscio. Pedicolo e gastro reticulati; il primo con qualche stria ai lati di ciascun nodo, il secondo col 1° tergite sparso di numerosi punti piliferi. Pilosità come nella operaia. Capo sub-quadrato, appena più lungo che largo coi lati dritti e cogli angoli occipitali marcati, sebbene arrotondati. Lo scapo non raggiunge l'occipite. Gli occhi sono piccoli, col maggiore diametro uguale allo spazio che sta tra l'estremità distale di essi e il margine anteriore delle guance. Mesonoto pressappoco così largo che il capo. L'epinoto è munito di due robusti e corti denti.

Lungh. mm. 7,8-8.

*Gen. OCYMYRMEX* Emery.

*Ocymyrmex robecchii* Em.

EMERY, 1922, *Gen. Insect. Myrmicinae*, pag. 271.

Javello, 21 aprile 1937: alcune ♀.

Malca Guba, 18 marzo 1937: alcune ♀.

Neghelli, 3 giugno 1937: alcune ♀.

*Ocymyrmex weitzackeri* Em.

EMERY, 1922, *Gen. Insect. Myrmicinae*, pag. 271.

Arero, 8 aprile 1937: 1 ♀.

*Gen. TETRAMORIUM* Mayr.

*Tetramorium sericeiventris* var. *debile* For.

EMERY, 1922, *Gen. Insect. Myrmicinae*, pag. 282.

Neghelli, 10 marzo 1937: qualche ♀ e 1 ♀ dealata.

Javello, 30 aprile 1937: alcune ♀.

Amba Mussolini (Canale Doria), 12 marzo 1937: alcune ♀.