

Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus
var. semispicata Sants.

EMERY, 1925, *Gen. Insect. Formicinae*, pag. 87.

Moyale, 20 maggio 1937: parecchie ♀ massime e minime.

Javello, 26 aprile 1937: numerose ♀ massime e minime.

Malca Guba, 19 marzo 1937: alcune ♀ minime che riferisco con dubbio a questa varietà perchè sono di statura maggiore e con colorazione più chiara. Le tibie però sono in parte mancanti di spine come nella vera var. *semispicata*.

Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus
ssp. pulvinatus Mayr.

EMERY, 1925, *Gen. Insect. Formicinae*, pag. 88.

Neghelli, 23 marzo 1937: parecchie ♀ massime, medie e minime.

Camponotus (Tanaemyrmex) somalinus E. André.

EMERY, 1925, *Gen. Insect. Formicinae*, pag. 100.

Moyale, 17 maggio numerose ♀.

Neghelli, 8 marzo 1937: numerose ♀.

Agero, 24 aprile 1937: numerose ♀.

Amba Mussolini (Ganale Doria), 12 marzo 1937: numerose ♀.

Camponotus (Tanaemyrmex) acvapimensis Mayr.

EMERY, 1925, *Gen. Insect. Formicinae*, pag. 91.

Neghelli, 26 marzo 1937: parecchie ♀ massime e minime.

Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus
ssp. cinctellus Gerst.

EMERY, 1925, *Gen. Insect. Formicinae*, pag. 105.

Neghelli, 26 marzo 1937: alcune ♀.

Malca Guba, 17 marzo 1937: alcune ♀.

Ganale Doria, 12 marzo 1937: alcune ♀.

Javello, 8 aprile 1937: alcune ♀.