

anche maggiormente obliqua. Il gastro è lucido, con scultura simile a quella del torace.

Lungh. mm. 6,8-7,3.

Ganale Doria, in prossimità dell'Amba Mussolini, 18 marzo 1937:
3 ♀ massime.

Appartiene al gruppo del *C. emarginatus* Em. e cioè al gruppo 4^o dei *Myrmamblys* che il SANTSCHI ha distinto in sub-genere col nome di *Myrmespera*. Nessuna però delle specie comprese in questa sezione presenta caratteri tali da poterla confrontare con la specie sopra descritta. L'unica specie che ha qualche rassomiglianza, almeno per quanto riguarda la forma generale del corpo, è il *C. crepuscoli* Arnold, dalla quale però si differenzia facilmente per la diversa colorazione, per la forma e scultura del capo, la quale ultima può paragonarsi a quella del capo di *C. nasutus* Em., ma però più fortemente impressa. Caratteristica poi è la pilosità che adorna la parte anteriore del capo del *C. criniticeps* che, mi pare, non esista in nessuna delle specie del sottogenere come lo ha delimitato il SANTSCHI.

Gen. POLYRHACHIS (F. Smith) Mayr.

Polyrhachis (*Myrma*) *viscosa* F. Sm.

EMERY, 1925, *Gen. Inseci. Formicinae*, pag. 206.

Neghelli, 30 marzo 1937: 1 ♀.