

*Curiosivespa curiosa* A. Rasnitsyn, sp. nov.

Рис. 127а

Голотип ПИН № 2383/143; Южный Казахстан (Кзыл-Жар), турон; отпечаток переднего крыла.

О п и с а н и е. Ячейка 3г резко расширена посредине. Ячейка 2gm по верхнему краю гораздо шире 3gm. Ячейка 2mсу начинается проксимальнее середины ячейки 2суа. 2m-су впадает в основание ячейки 3gm. Длина переднего крыла около 10 мм.

М а т е р и а л. Голотип.

*Curiosivespa magna* A. Rasnitsyn, sp. nov.

Рис. 127б

Г о л о т и п ПИН № 2783/190; южный Казахстан (Кзыл-Жар), турон; неполный отпечаток переднего крыла.

О п и с а н и е. Ячейка 3г ланцетовидная, почти симметричная. Верхний край ячеек 2—3gm почти равной длины. Ячейка 2mсу начинается дистальнее середины ячейки 2суа. Длина переднего крыла 22 мм.

С р а в н е н и е. Отличается от предыдущего вида ячейкой 2суа, сильнее вытянутой над ячейкой 2mсу, и крупными размерами.

М а т е р и а л. Голотип.

by G. M. Dlussky НАДСЕМЕЙСТВО FORMICOIDEA LATREILLE, 1802

СЕМЕЙСТВО FORMICIDAE LATREILLE, 1802<sup>1</sup>

ПОДСЕМЕЙСТВО SPHECOMYRMINAE WILSON ET BROWN, 1967

Д и а г н о з. Рабочий. Мандибулы короткие, изогнутые, с двумя зубцами. Антенны 12-члениковые, с удлиненным, но все же коротким (по сравнению с обычным для муравьев) скапусом и очень длинным (для рабочих муравьев) почти нитевидным жгутиком, без булавы. Первый членик жгутика (педицеллус) самый короткий, значительно короче остальных, второй — самый длинный. Большие (для рабочих) фасеточные глаза располагаются почти посредине боков головы. Глазки имеются. Переднеспинка отделена от среднеспинки швом; возможно, сочленение подвижное. Среднеспинка с обособленным щитиком. Мезоплевры с плевральным швом. Эпинотум (пропodeум) отделен от щитика глубоким швом. Метоплевральные железы хорошо развиты. Формула шпор голеней 1:2:2. Коготки с зубчиком. Петиолюс одночлениковый, узловидный, суженный к местам сочленения с эпинотумом и брюшком. Брюшко без перетяжки между первым и вторым (морфологически третьим и четвертым) сегментами. Жало имеется.

С а м е ц. Мандибулы узкие, по-видимому, без зубцов. Антенны 13-члениковые с коротким, но отчетливым скапусом и нитевидным жгутиком. Первый членик жгутика (педицеллус) самый короткий, почти поперечный; второй — самый длинный; последующие членики постепенно укорачиваются. Нижнечелюстные щупики пятичлениковые. Нижнегубные щупики трехчлениковые. Голова широкая с выпуклым лбом и большими фасеточными глазами, расположенными почти посредине боков головы. Глазки хорошо развиты. Переднеспинка прямоугольная с оттянутыми и утолщенными верхними углами. Щитик сильно выпуклый. Заднеспинка отчетливая, сравнительно широкая. Эпинотум (пропodeум) выпуклый, не угловатый. Мезоплевры с хорошо развитым плевральным швом. Мета-

<sup>1</sup> Раздел составлен Г. М. Длусским.