



Рис. 131—134. Семейство Formicidae

131a. *Petropone petiolata* sp. nov.; голотип ПИН № 2783/158. 131b. *Cretopone magna* sp. nov.; голотип ПИН № 2284/14. 132. *Archaeopone kyzylcharica* sp. nov.; голотип ПИН № 2383/263. 133. *Dolichomyrma longiceps* sp. nov.; голотип ПИН № 2383/145. 134. *D. (?) latipes* sp. nov.; голотип ПИН № 2383/144. Все образцы из Кызыл-Жара, верхний мел.

Условные обозначения: cly — наличник, fo — затылочное отверстие, lbr — верхняя губа, md — мандибула, st<sub>2</sub> — петиолюс, vg<sub>2</sub> — второй вальвифер яйцеклада

### Род *Archaeopone* Dlussky, gen. nov.

Типовой вид *A. kyzylcharica* Dlussky sp. nov.; Южный Казахстан; поздний мел.

Д и а г н о з. Самец. Грудь с полным расчленением, типичная для самцов муравьев. Петиолюс не подразделен на рукоять и узелок; наибольшая его ширина в месте сочленения с брюшком. Между двумя первыми сегментами брюшка имеется перетяжка. Тергиты брюшка обычного строения. Гениталии примитивного для муравьев строения. Вальвы широкие, слегка вогнутые внутрь.

С р а в н е н и е. Описываемый род имеет петиолюс архаичного строения, характерного для трибы *Amblyoropini* и примитивных представителей трибы *Ectatommini*. Более точно установить отношение *Archaeopone* к кайнозойским родам невозможно из-за плохой сохранности отпечатка. От *Cretopone* и *Petropone* отличается строением петиолюса.

Видовой состав. Типовой вид.