

*Archaeopone kyzylzharica* Dlussky, sp. nov.

Рис. 132.

Вид назван по местонахождению.

Г о л о т и п ПИН № 2383/263; Южный Казахстан (Кзыл-Жар); турон.

О п и с а н и е. Самец. Петиолюс равной длины и ширины, почти вдвое короче первого тергита брюшка. Длина тела около 10 мм; груди 2,6 мм; петиолюса 0,4 мм.

З а м е ч а н и е. От *Cretopone magna* sp. nov., найденной в тех же отложениях, отличается, помимо строения петиолюса, меньшими размерами. Это не могут быть различия связанные с половым диморфизмом, поскольку у всех примитивных муравьев размеры самок и самцов сильно не отличаются.

М а т е р и а л. Голотип. Плохо сохранившийся отпечаток груди, петиолюса и брюшка. Брюшко растянуто.

SUBFAMILIA INCERTAE SEDIS

Род *Dolichomyrma* Dlussky, gen. nov.

Т и п о в о й в и д. *D. longiceps* Dlussky, sp. nov.; южный Казахстан; поздний мел.

Д и а г н о з. Рабочий. Голова удлиненная, глаза сильно смещены назад. Наличник слабо выдающийся вперед, сильно выпуклый в профиль. Его передний край равномерно выпуклый, без вырезки или выростов. Лобные валики длинные, параллельные (у *D. latipes* sp. nov. не видны). Переднегрудь, среднегрудь и эпинотум разделены. Стебелек одночлениковый, без чешуйки. Брюшко округлое, без перетяжки между первыми сегментами.

В и д о в о й с о с т а в. Два описываемых ниже вида из южного Казахстана. Поздний мел.

С р а в н е н и е. Расчлененная грудь, одночлениковый стебелек и округлое брюшко характерны для представителей подсемейств Sphesomyrminae, Dolichoderinae, Formicinae и рода *Nothomyrmecia* Clark подсемейства Мургесиинае. Поскольку такие признаки, как строение конца брюшка, мезонотума и провентрикулюса, служащие диагностическими признаками подсемейств, у *Dolichomyrma* неизвестны, точную систематическую принадлежность нового рода определить невозможно. По строению головы этот род хорошо отличается от всех описанных Sphesomyrminae и *Nothomyrmecia*, но сходен с некоторыми Formicinae (мелкие рабочие *Proformica* Ruzs. и *Cataglyphis*. Först.) и Dolichoderinae (некоторые *Iridomyrmex* Mayr). От Formicinae и *Iridomyrmex* отличается отсутствием чешуйки на петиолюсе. Строение наличника примитивное для Dolichoderinae. Таким образом, *Dolichomyrma* является либо примитивным родом Dolichoderinae, либо специализированным родом Sphesomyrminae.

*Dolichomyrma longiceps* Dlussky, sp. nov.

Рис. 133

Г о л о т и п ПИН № 2383/145; южный Казахстан (Кзыл-Жар); турон.

О п и с а н и е. Рабочий. Длина головы в 1,5 раза больше ширины и лишь немного меньше длины груди. Мандибулы с продольными морщинами. Тело стройное с длинными тонкими ногами. Длина тела около 5 мм; головы 1,4 мм; ширина головы под глазами 0,95 мм; длина груди 1,7 мм.

М а т е р и а л. Голотип. Плохо сохранившийся отпечаток.