

陷, 宽约为长的 2.3 倍. 腹柄下突角状. 上颚具细纵条纹. 头前部和唇基具密集细纵条纹, 头后部光滑. 胸部、腹柄和腹部光滑发亮. 头和体背面具密集直立、亚直立毛, 缺绒毛被. 触角柄节和后足胫节背面具密集亚直立毛和丰富绒毛被, 触角鞭节和附节具密集绒毛被. 体暗红褐色.

2.3 基特细颚蚁 *Leptogenys kitteli* (Mayr)

Mayr, 1870, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. 20: 966 (*Lobopelta*)^[10]. Forel, 1900, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13: 306, 312.

工蚁 (附图 4~6): TL 7.7~9.5, HL 1.73~2.10, HW 1.30~1.63, CI 70~78, SL 1.80~2.20, SI 135~143, PW 1.00~1.25, AL 2.70~3.00, ED 0.35~0.45 (n=7). 头部长方形, 长大于宽, 前部稍宽于后部, 后头缘轻度隆起, 后头角圆钝. 上颚狭长, 咀嚼缘不具齿. 唇基三角形, 中部隆起, 无中央纵脊, 前缘中央圆形突出. 触角长, 柄节约 2/5 超出后头角, 鞭节各节长大于宽. 侧面观前胸背板高, 圆形突起, 前中胸背板缝浅凹; 后胸沟深凹. 并胸腹节低, 背面长于端面, 适度隆起. 侧面观腹柄节近方形, 前倾, 前面和后面近平行, 背面隆起, 前上角钝圆. 背面观腹柄结呈梯形, 宽约为长的 1.2 倍, 后部宽于前部. 腹柄下突低, 钝齿状. 上颚、唇基、头部和胸部具密集细纵条纹, 前胸背板条纹呈同心圆状. 腹柄具弱的密集细条纹. 腹部光滑发亮. 头和体背面具丰富直立、亚直立短毛, 缺绒毛被. 触角和足具丰富亚直立短毛和密集亚倾斜绒毛被. 体黑色, 具蓝紫色金属光泽. 触角鞭节和附节暗红褐色, 触角基瘤和鞭节末端橙黄色.

2.4 小细颚蚁 *Leptogenys diminuta* (Smith)

Smith, 1857, Journ. Linn. Soc. 2: 69 (*Ponera*). Forel, 1900, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13: 307, 312.

工蚁 (附图 7~9): TL 6.8~7.0, HL 1.50~1.55, HW 1.05~1.10, CI 70~71, SL 1.65~1.75, SI 157~159, PW 0.80~0.85, AL 2.30~2.35, ED 0.33~0.35 (n=2). 头部近长方形, 长大于宽, 前部稍宽于后部, 后头缘轻度隆起, 后头角圆. 上颚狭长, 咀嚼缘不具齿. 唇基三角形, 具中央纵脊, 前缘中央圆形突出, 不具刺. 触角细长, 柄节约 2/5 超过后头角, 鞭节各节长大于宽. 侧面观胸部在中胸前部收缩, 前胸背板高, 圆形隆起. 后胸沟凹陷. 并胸腹节低, 背面轻微隆起, 显著长于端面. 侧面观腹柄结方形, 前倾, 前面和后面近平行. 背面轻微隆起. 背面观腹柄结近梯形, 后部宽于前部, 宽约为长的 1.1 倍. 腹柄下突齿状, 位于前下角. 上颚具密集细纵条纹. 头部具密集纵条纹, 在头后部呈圆弧形. 胸部和腹柄具不规则粗糙皱纹和密集刻点. 腹部光滑发亮. 头和体背面具丰富直立毛, 缺绒毛被. 触角和足具丰富亚直立毛和密集亚倾斜绒毛被. 体黑色, 上颚、触角柄节、胫节、附节和腹末端暗红褐色.

2.5 勃固细颚蚁 *Leptogenys peuqueti* (André)

André, 1887, Rev. Ent. 6: 292 (*Lobopelta*). Forel, 1900, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13: 309.

工蚁: 体长 6.0 mm. 头部卵圆形, 后部比前部稍窄. 上颚狭长, 咀嚼缘不具齿. 唇基三角形, 具突出的中央纵脊. 触角柄节显著超过后头缘, 鞭节第 2 节长为第 1 节的 2 倍. 胸部狭窄, 前中胸背板缝和后胸沟显著. 并胸腹节左右压扁. 腹柄结大, 左右强烈