

УДК 595.796

© 1994 г. А. Г. РАДЧЕНКО

ОБЗОР ВИДОВ ГРУППЫ *LOBICORNIS* РОДА *MYRMICA*
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ПАЛЕАРКТИКИ

В статье приведен обзор видов группы *lobicornis* с разбором синонимии; впервые описаны половые особи у *M. kasczenkoi* Ruzs., *M. forcipta* Karaw. (♀♀) и *M. angulinodis* Ruzs. (♂); для *M. commarginata*, *M. kasczenkoi*, *M. angulinodis*, *M. saposhnikovii* обозначены неотипы; *M. kirgisorum* возведен в ранг вида; девять инфравидовых названий сведены в синонимы.

Myrmica sulcinodis Nylander, 1846

Синонимию до 1905 г. см.: Рузский, 1905 : 703.

Nylander, 1846 : 934, ♀♀ (*Myrmica*) (Finland : Helsingfors); Emery, 1908 : 166; 1916 : 119; 1921 : 42; Donisthorpe, 1915 : 29; Finzi, 1926 : 86; Arnoldi, 1934 : 157; Weber, 1948 : 267; Sadil, 1951 : 242; Bernard, 1968 : 121; Pisarski, 1969 : 227; 1969a : 96; Арнольди, 1970 : 1839; Baroni Urbani, 1971 : 36; Дмитриенко, Петренко, 1976 : 18; Agosti, Collingwood, 1987 : 267; Seifert, 1988 : 7; Купянская, 1986 : 128; Forel, 1874 : 76 (*rubra* г.).

= *perelegans* Curtis, 1854 : 214, ♀♀♂ (*Myrmica*)
= *sulcinodo-scabrinodis* Forel, 1874 : 80, ♀ (*sulcinodis* var.)
= *nigripes* Ruzsky, 1896 : 73, ♀ (*sulcinodis* subsp.) (Урал, синтипы в ЗМ, изучены); Рузский, 1905 : 707, ♀♀♂; Emery, 1908 : 174; 1921 : 42; Рузский, 1036 : 95; Арнольди, 1970 : 1839, sup. п.
= *myrmecophila* Wasmann, 1910 (*Myrmica*)
= *derzhavini* Ruzsky, 1920 : 77, ♀ (*sulcinodis* subsp.) (Камчатка: берег р. Еловки, типы утеряны)
= *gallienii*: Bernard, 1968 : 121 (nec. Bondroit, 1918 et auct.)
= *eximia* Kupianskaya, 1990 : 104, ♀♀♂ (*sulcinodis* subsp.) (Бурятия, Амурская обл., Хабаровский край, Сахалин, голотип и ЗМ, паратипы в БПИ, изучены), sup. п.

Синонимия. Различными авторами было описано шесть инфравидовых форм *M. sulcinodis*, в том числе пять — с территории рассматриваемого региона. Часть названий уже сведена в синонимы (Bernard, 1968, Seifert, 1988; Купянская, 1986a). Типы var. *nigripes* Ruzsky нами изучены, они укладываются в пределы изменчивости *M. sulcinodis*. Вариегат *sulcinodo-rugulosa* (Насонов, 1889) относится к *M. rugulosa* (материал Н. Насонова в ЗИН РАН, изучен). Замечания о var. *vicaria* Kuznetzov-Ugamskij, 1928 см. в конце статьи. Выделять подвид *eximia*, на наш взгляд, нецелесообразно, поскольку повсеместно от Алтая до Тихого океана встречаются особи как с признаками типичной *M. sulcinodis*, так и subsp. *eximia*, а также экземпляры с промежуточными признаками.

З а м е ч а н и я. Относительно слабо изменчивый вид. Представители южных горных популяций в целом несколько мельче и светлее; на Алтае и в Сибири они темнее, чем на севере Русской равнины; в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке у многих особей шипы проподоума загнуты внутрь.

Географическое распространение. Борейальный вид, встречающийся от Атлантики до Тихого океана. На север доходит до тундр, на юг —