

Форма и размеры зубчиков проподеума варьируют от закругленных треугольных бугров до острых коротких зубчиков. Постпетиолюс низкий, с длинными покатыми передней и задней поверхностями.

Мезонотум, стебелек и брюшко с относительно короткими и немногочисленными отстоящими волосками; задние голени с короткими полуотстоящими волосками.

Тело темно-бурое до черного, ноги и антенны бурые.

Размеры: $HL = 0,84-0,95$, $HW = 0,76-0,88$, $SL = 0,63-0,71$, $TL = 1,75-1,83$ мм.

Географическое распространение. Юг и юго-восток Алтая, Тува, южное и юго-восточное Забайкалье, Северная Монголия.

Экология. Характерен для степей, сухих лугов и сосновых боров, гемиксерофил.

Myrmica angulinodis Ruzsky, 1905

Рузский, 1905 : 689, ♀♀ (*scabrinodis* subsp.) (Иркутская губ.: окрестности р. Турки, р. Улунтай, приток р. Слюдянки, типы утеряны, неотип в ЗМ); Emery, 1921 : 41; Рузский, 1936 : 95. Pisarski, 1969 : 227 (*Myrmica*): 1969a : 296; 1981 : 155; Дмитриенко, Петренко, 1976 : 16.

= *baikalensis* Karawajew, 1931 : 28, ♀♀ (*scabrinodis saposchnikovi* var.) (Байкал: Лиственничное, синтипы в ИЗ, изучены), суп. п.

= *forcipata*: Купьянская, 1990 : 107 (*Myrmica*), пес. Karawajew, 1931.

= *kasczenkoi*: Купьянская, 1990 : 113 (*Myrmica*), пес. Рузский, 1905.

Синонимия. Сравнение типов *M. saposchnikovi* var. *baikalensis* Karaw. с обширным материалом из различных районов Сибири, в том числе и из типового местонахождения, а также с описанием *M. angulinodis* Ruzs. показало их идентичность. Поскольку типы М. Д. Рузского утеряны, мы обозначаем неотип: рабочий, Иркутская обл.: Качукский р-н, Ацикан, No. 285, 28.VIII.1986 (Плешанов), хранится в ЗМ.

Ниже описываем не известных ранее самцов.

Описание. Самцы (рис. 2, з-ж).

Голова субквадратная ($HI = 0,98-1,06$), с почти параллельными боковыми сторонами, слабо закругленными задними углами и слабо выпуклыми затылочным краем и передним краем клипеуса. Скапус средних размеров ($SI = 1,21-1,35$), согнут нерезко, на сгибе без уголка.

На всей поверхности головы мелкозернистая скульптура, лишь на лбу могут быть единичные нежные морщинки. Отстоящие волоски на голове многочисленные, скапус с обильными, тонкими, короткими полуотстоящими волосками.

Бока груди с многочисленными нежными морщинками, более грубыми на проподеуме; членики стебелька с шагреновой скульптурой, сглаженной на постпетиолюсе. Проподеум с треугольными тупыми или заостренными зубчиками. Петиолюс высокий, с крутыми передней и особенно задней поверхностями. Мезонотум, стебелек и брюшко с многочисленными отстоящими волосками, задние голени с довольно грубыми полуотстоящими волосками. Грудь, стебелек, ноги и скапус бурые, голова и брюшко черно-бурые.

Размеры: $HL = 0,85-0,99$, $HW = 0,87-0,97$, $SL = 0,69-0,78$, $TL = 1,61-1,90$ мм.

Географическое распространение. Сибирь от Саян до Тихого океана, включая Приморье, Забайкалье, Северная Монголия.

Экология. Характерный представитель тайги.

Замечания. Рузским (1925, 1926, 1946) и Вашкевич (1924, 1926) этот вид указан для Западной Сибири. Среди обширного материала из указанного региона мы *M. angulinodis* не обнаружили и сказать, к какому виду относятся эти указания, не представляется возможным.